

Infektion	Infektionsbild beim Spender	Infektionsbild beim Empfänger
HIV	Klinische Zeichen zum Zeitpunkt der Spende und/oder innerhalb von 6 Monaten Serokonversion und/oder HIV NAT pos.	Klinische Zeichen einer frischen Infektion innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung der Blutprodukte und/oder
		Anti-HIV Serokonversion und/oder HIV-RNA innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung der Blutprodukte.
HBV	Klinische Zeichen einer frischen Infektion zum Zeitpunkt der Spende und/oder später HBV NAT pos. und/oder Nachweis von Anti-HBc-IgM und/oder Serokonversion des Anti-HBs ohne Impfung und/oder bestätigtes Anti-HBc ohne Anti-HBs und/oder HBsAg positiv bei erneuter Untersuchung.	Klinische Zeichen einer frischen HBV-Infektion innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung der Blutprodukte und/oder;
	Klinische Zeichen einer chronischen Infektion zum Zeitpunkt der Spende oder während einer Look back-Abklärung.	Auftreten von HBsAg und/oder Serokonversion von Anti-HBc und/oder Nachweis von Anti-HBc-IgM und/oder HBV-DNA innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung der Blutprodukte.
HCV	Klinische Zeichen zum Zeitpunkt der Spende und/oder innerhalb von 6 Monaten Serokonversion und/oder HCV-Core-Ag und/oder HCV NAT pos.	Klinische Zeichen einer frischen HCV-Infektion bis 6 Monate nach Verabreichung der Blutprodukte und/oder;
		Anti-HCV-Serokonversion innerhalb von 6 Monaten und/oder;
		Auftreten von HCV-RNA innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung der Blutprodukte.