Annexe Art. 7.3
Vaccine Check - Check vaccination

BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Valable dès: 01/02/2027
Version 8

Les délais applicables au don de cellules souches (CT/VT et MC) sont les mêmes que pour le don de sang (prélèvement: contacter SBSC).
Les immunisations passives (administration d'anticorps après une exposition) ne sont pas indiquées dans le check vaccination. Elles figurent à l'annexe, art. 7.1 Délais de CIT pendant ou après la prise de médicaments, sous immunobiothérapeutiques.

Légende | ajouté | modifie | supprimé

Anatoxines et vaccins inactivés ou à sous-unité protéique ou à base de vecteurs non réplicatifs ou à base d'ARNm

COVID-19	Comirnaty® , COVID-19 Vaccine Janssen Johnson & Johnson , COVID-19 Vaccine Moderna ®, Nuvaxovid®, Spikevax®	48 heures
COVID-19	Comirnaty® , Nuvaxovid®, Spikevax®	48 heures
Cancer du col de l'utérus / Verrues génitales (papillomavirus humain / HPV)	Gardasil® 9, Cervarix®	48 heures
Cancer du col de l'utérus / Verrues génitales (papillomavirus humain / HPV)	Gardasil® 9	48 heures
Charbon (Anthrax)		48 heures
Chikungunya	Vimkunya®	48 heures
Choléra	Dukoral®	48 heures
Coqueluche (Pertussis) (seul ou combiné)		48 heures
Diphtérie (seul ou combiné)		48 heures
Encéphalite japonaise	Ixiaro®	48 heures
Grippe (saisonnière)		48 heures
Herpès génital	Lupidon®	48 heures
Hépatite A (seul ou combiné)	seul ou combiné	2 semaines
Hépatite A et/ou hépatite B (seul ou combiné)		2 semaines
Hépatite B (seul ou combiné)	seul ou combiné	2 semaines
Méningite (à Haemophilus influenzae de type b)		48 heures
Méningite à méningocoques		48 heures
Méningoencéphalite à tiques	FSME-Immun®, Encepur N®	48 heures
Pneumonie à pneumocoques		48 heures
Poliomyélite (paralysie infantile, vaccin parentéral de Salk) (seul ou combiné)		48 heures
Rage	Rabipur®	48 heures
Rage	Rabipur®, Vaccin rabique Mérieux®	48 heures
Tétanos (seul ou combiné)		48 heures
VRS (Virus respiratoire syncytial humain)	Abrysvo® , Arexvy®	48 heures
Zona (virus varicelle-zona)	Shingrix®	48 heures

Vaccins vivants atténués ou à base de vecteurs réplicatifs

Dengue	Qdenga®	4 semaines
Fièvre jaune	Stamaril®	4 semaines
Fièvre typhoïde / paratyphoide (oral)	Vivotif®	4 semaines
Rotavirus	Rotarix®	4 semaines
Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)		4 semaines
Rougeole-oreillons-rubéole-varicelle (RORV)	Proquad®	4 semaines
Rubéole (seul ou combiné)		4 semaines
Tuberculose (BCG)		4 semaines
Varicelle		4 semaines
Variole simienne (Mpox), Variole	Jynneos®	4 semaines
Zona (herpes zoster)	Zostavax®	4 semaines

Immunisation passive après exposition (administration d'immunoglobulines) (ne fera plus partie du Vaccine Check – contrôle vaccinal à partir du 01.02.2027)

Rage	Berirab®	12 mois
Tétanos	Tetagam®	12 mois

Vaccin contenant de l'albumine humaine

Rages	Vaccin rabique Mérieux®	12 mois

Vaccins non autorisés

Période d'attente de 12 mois

Réalisé le: 19/10/2026 08h58