Spendetauglichkeitskriterien - Blutspende

REFERENZEN

1. Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV) – aktuelle Version
2. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components - Council of Europe Press - aktuelle Version

Dokumentation und allgemeine Grundsätze

Die Spendetauglichkeitskriterien sind eine Arbeitshilfe und haben zum Ziel, die Sicherheit von Spender und Empfänger zu gewährleisten. Sie gelangen bei allen homologen Blutspenden zur Anwendung.

Die Spendetauglichkeitskriterien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Datei ist über die Website der B-CH AG zugänglich. Ergänzt wird diese Datei durch weitere Dokumente wie die „Medikamentenliste“, „Impfliste“, „Travelcheck Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken “ oder „spezifische Kriterien für die Durchführung der Blutspende“.

Die Kriterien werden unter Beachtung von europäisch verbindlichen Vorgaben regelmässig von der zuständigen Fachgruppe aktualisiert. Der medizinische Direktor setzt Änderungen in Kraft und kündigt diese an. Die elektronische Form auf der Website entspricht stets der aktuellen Version.

Die Spendetauglichkeit wird durch ausgebildetes Personal unter der Verantwortung eines Arztes des RBSD ermittelt. Zeigen sich bei der Befragung/Untersuchung Hinweise oder Befunde, welche die Spendetauglichkeit in Frage stellen, so müssen diese anhand der Kriterien interpretiert werden. Bei Rückweisung oder Ausschluss muss der Spender eine detaillierte Erklärung über den Grund der Rückweisung erhalten.

Wenn Zweifel über die Spendetauglichkeit bestehen oder ein gesundheitliches Risiko für Spender oder Empfänger vermutet oder erkannt wird, welches in den Kriterien nicht oder ungenügend beschrieben ist, entscheidet der Arzt des RBSD. Solche Situationen sind der Abteilung BSD der B-CH AG zu melden.

In diesem Dokument verwendete Terminologie

Vorgehen	
Ausschluss	Zeitlich unlimitierte~~, nicht rückgängig zu machende~~ Massnahme. Der Spender muss in einer für ihn verständlichen Form informiert werden.
Rückweisung	Zeitlich limitierte Massnahme. Der Spender muss wissen, wann und wie er wieder zugelassen wird.
Akzeptieren	Der Spender wird zum Blutspenden zugelassen.

Die Bezeichnung "Spender" gilt sowohl für Spenderinnen und Spender.

Erkrankung, Kardio-vaskuläre	Vorgehen	~~Akzeptieren, falls kongenital z. B. komplikationslos operierte Herz-fehler, symptomfrei und keine Endokarditis-Prophylaxe erforderlich.~~ Akzeptieren bei Mitralklappenprolaps. Ausschluss, insbesondere bei: • Koronare Herzkrankheit (KHK) • Angina pectoris • Herzinfarkt • schweren organisch bedingten Herzrhythmusstörungen • Vorhofflimmern • Herzschrittmacher • Status nach Herzoperationen (Bypass) • Patienten unter Endokarditis-Prophylaxe • Status nach Stent/Laser • arteriellen Gefässverschlüssen • Claudicatio intermittens • ~~Gefässaneurysmata~~ • Mitralklappenstenose (rheumatische Herzkrankheit) • pulmonale Hypertonie • Herzinsuffizienz • Kardiomyopathie.~~.~~
	Siehe auch	Transplantation Herzfehler Endokarditis Perikarditis / Myokarditis Bradykardie Gefässaneurysma Hypercholesterinämie Spondylitis ankylosans Herzrhythmusstörung Blutdruck- Hoher / Hypertonie Blutdruck- Niedriger / Hypotonie Tachykardie

Bradykardie	Vorgehen	Akzeptieren, ~~falls Normalisierung bei 2. Blutdruckmessung (ev. nach Essen) oder~~ wenn der Spendende asymptomatisch ist und ~~der Spender~~ Sportler ist oder wenn aufgrund der körperlichen Arbeit (Beruf) die Bradykardie erklärt werden kann.~~eine körperliche Arbeit ausführt und keine Nebenwirkung aufweist.~~ Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls Herzfrequenz unter 50 ~~und nicht durch Medikamente bedingt~~.
	Siehe auch	Blutdruck- Hoher ~~-~~/ Hypertonie
Herzrhythmusstörung	Vorgehen	Akzeptieren, falls nur atemabhängig. Akzeptieren bei Extrasystolen (VES oder SVES), falls asymptomatisch und nur sporadisch auftretend. Akzeptieren nach Ablation, wenn erfolgreich~~, kompensiert~~ und ohne Medikamente. Akzeptieren bei Zustand nach paroxysmalem Vorhofflimmern ohne zugrunde liegende Herzerkrankung und ohne Medikation. Ausschluss bei allen anderen Vorhofflimmerformen, auch wenn mit Medikamenten behandelt. ~~Ausschluss bei organischer Ursache.~~ Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD bei ungeklärter Ursache.
Gefässaneurysma	Vorgehen	Ausschluss. Bei traumatischer Ursache: Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.
Blutdruck- Hoher / Hypertonie	Vorgehen	Rückweisung, falls fixierter Puls < ~~60~~50/~~Min~~min. und/oder systolischer Blutdruck < 120 mm Hg mit Betablocker. Rückweisung, wenn Blutdruck entweder systolisch > 180 mm Hg oder diastolisch > 100 mm Hg beträgt. Rückweisung nach Antihypertensiva-Behandlungsbeginn oder Medikamentenwechsel bis Blutdruck eingestellt ist.
	Siehe auch	Bradykardie

Puls	Siehe auch	Tachykardie Bradykardie Herzrhythmusstörungen
Kardiomyopathie	Definition	Herzmuskelerkrankung
	Vorgehen	Ausschluss.
Endokarditis	Definition	Entzündung des Endokards (Herzinnenwand), oft Herzklappen betroffen. Nicht infektiös oder infektiös (akut / subakut / bakteriell / viral / mykotisch).
	Zu beachten	Mögliche Grunderkrankung erfragen (z.B. Herzklappenfehler, angeborener Herzfehler).
	Vorgehen	RW für 6 Monate nach vollständiger Genesung und keine Endokarditisprophylaxe.
Perikarditis / Myokarditis	Definition	Entzündung des Herzbeutels / Herzmuskels.
	Vorgehen	RW für 6 Monate nach vollständiger Genesung, wenn Ursache infektiös oder traumatisch. Ausschluss bei systemischer Erkrankung (Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen, Sarkoidose, endokrinologische Erkrankungen).
~~Perikarditis, virale~~	~~Vorgehen~~	~~Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.~~
Hypercholesterinämie	Vorgehen	Akzeptieren auch bei Behandlung, wenn kein anderer kardiovaskulärer Rückweisungsgrund vorliegt. ~~Akzeptieren wenn diese nicht mit einer Herzerkrankung, Vaskulären-Erkrankung oder anderen symptomatischen Erkrankungen einhergeht.~~
	Siehe auch	Erkrankung, Kardio-vaskuläre

~~Herzgeräusche~~	~~Vorgehen~~	~~Akzeptieren, falls asymptomatisch, lageabhängig und leise bis 2/6. Alle übrigen Herzgeräusche müssen beim Hausarzt abgeklärt werden.~~ ~~Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.~~
Herzfehler	Definition	Angeborene oder erworbene Strukturbesonderheit des Herzens oder angrenzender Gefässe mit Funktionseinschränkung des Herz-Kreislauf- oder des Herz-Lungensystems, z.B.: • Atrioventrikulärer Septumdefekt (AVSD) • Atriumseptumdefekt (ASD) / Persistierendes Foramen ovale (PFO) Gefäss- und Klappenfehlbildungen
	Vorgehen	Akzeptieren wenn kongenital (z. B. komplikationslos operierte Herzfehler), symptomfrei und keine Endokarditis-Prophylaxe erforderlich. ~~Gehe zu: Erkrankung, kardio-vaskuläre~~
Arteriosklerose inkl. ~~Koronare~~ koronare Herzkrankheit (KHK) *Nur Deutsch*	Vorgehen	Ausschluss bei: • koronarer Herzkrankheit (inkl. Angina pectoris) • Herzinfarkt • St. n. Bypass-OP/Stent oder koronarer Lasertherapie • arteriellem Aneurysma • Periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVK) • arterieller Thrombose nach zerebrovaskulärem Insult (CVI, „Hirnschlag“) • transitorischer ischämischer Attacke (TIA, „Streifung“)
Glaukom (Grüner Star)	Definition	Schädigung des Sehnervs durch Druckanstieg im Auge.
	Vorgehen	Akzeptieren bei Behandlung ausschliesslich mit Augentropfen ~~oder Anwendung von Betablockern und bestätigter Pulsrate > 60/Min. und Blutdruck > 120/60 mm Hg.~~. Rückweisung bei allen anderen Behandlungen bis Behandlungsende.
	Siehe auch	Glaukom Operation
Puls, unregelmässig	Vorgehen	Gehe zu Herzrhythmusstörungen

~~Epilierung, elektrische~~ Epilation mit Nadel, elektrische	Definition	Verfahren zur dauerhaften Haarentfernung, bei dem mit einer feinen Sonde elektrischer Strom in den Haarfollikel geleitet wird, um die Haarwachstumszellen gezielt zu zerstören.
	Vorgehen	Rückweisung 4 Monate
	~~Gehe zu~~	~~Akupunktur~~
	Siehe auch	Epilation / Haarentfernung
Epilation / Haarentfernung	Definition	Körperhaarentfernung mit chemischen oder mechanischen Hilfsmittel (z.B. Epiliergerät, Wachsen, Rasieren, Sugaring, Haarentfernungscremes, Pinzette).
	Vorgehen	Akzeptieren wenn Haut reizlos und intakt. Rückweisung in allen anderen Fällen.
	Siehe auch	Hautverletzung Epilation mit Nadel, elektrische Laserbehandlung Haut
Immunobiotherapie	Zu beachten	Nach zugrunde liegender Krankheit fragen.
	Vorgehen	Akzeptieren bei bakteriellen Präparaten (z. B. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccalin®, Luivac®, Ribomunyl®), falls keine chronische Grunderkrankung oder rezidivierende Infektion vorliegt. Rückweisung für ~~12~~ 4 Monate nach Absetzen von Serotherapie/Immunobiotherapie mit Präparaten menschlichen Ursprungs (z. B. Cytotect CP Biotest®, Hepatect CP®, ~~Tollwut- und Tetanus-Passivimpfstoff~~, Varitect CP®, Tetanus-Passivimpfstoff (Tetagam® P)). Rückweisung für 12 Monate nach Tollwut-Passivimpfstoff (Postexpositionsprophylaxe, z.B. Berirab®). ~~Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD nach Behandlung mit Präparaten tierischen Ursprungs/Zelltherapie (z. B. Präparate bovinen Ursprungs wie früher Solcoseryl®).~~
	Siehe auch	Monoklonale Antikör-per (Behandlung)
Bissverletzung, Haus-/Wildtiere	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. Rückweisung für 12 Monate nach Bissverletzung in Tollwut Endemiegebiet (mit oder ohne Post-Expositionsprophylaxe). (Tollwut wurde in der Schweiz und in umgrenzenden Ländern ausgerottet~~. Problem nur bei Biss in Endemiegebieten zu berücksichtigen.~~) ~~Im Zweifelsfall Rückweisung für 12 Monate.~~
	Siehe auch	Anhang Art. 7.3 Vaccine-Check~~Impfung~~
Augentumorenentfernung	~~Zu beachten~~	~~Alle Hirnhauteröffnungen bedingen Ausschluss.~~
	Vorgehen	Gehe zu Operation, Augen

Hautverletzung	Vorgehen	Rückweisung, falls offene Wunde und/ oder Zeichen von Entzündung. Rückweisung für 2 Wochen nach Entfernung des Materials bei Wundnaht bzw. -verschluss und ohne Anzeichen von Infektion
	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut Piercing Tätowierung / Tattoo ~~Verletzung~~ Ekzem Psoriasis Erkrankung Haut
~~Verletzung~~	~~Vorgehen~~	~~Rückweisung bis zur vollständigen Wiederherstellung (ohne Zeichen von Hautentzündung).~~
	~~Siehe auch~~	~~Spitalpersonal~~ ~~Traumatologie~~
Wunde	Gehe zu	Hautverletzung
	~~Vorgehen~~	~~Rückweisung, falls offene Wunde.~~ ~~Rückweisung für 2 Wochen nach Entfernung des Materials bei Wundnaht bzw. -verschluss und ohne Anzeichen von Infektion.~~
Hautentzündung	Gehe zu	Hautverletzung
	~~Vorgehen~~	~~Akzeptieren, wenn die Läsionsfläche klein ist, die Behandlung nur lokal ist (z. B. Salbe, Creme, Schaum) und die Einstichstelle nicht betroffen ist.~~
Ekzem	Definition	Eine atopische Dermatitis (häufig als Ekzem bezeichnet) ist eine chronische, juckende Entzündung der oberen Hautschichten und tritt häufig bei Personen auf, die Heuschnupfen oder Asthma haben oder in deren Familie diese allergischen Erkrankungen vorkommen.
	Vorgehen	Akzeptieren, vorausgesetzt dass: • kleine begrenzte Hautfläche und • Einstichstelle ohne Befund und • keine oder nur lokale Behandlung. Rückweisung, bei offenen Hautstellen ~~bis Abheilung~~ und/ oder Zeichen von Entzündung. Rückweisung, falls Behandlung mit oralen Kortikosteroiden bis 2 Wochen nach Therapieende.
	Siehe auch	Hautverletzung Erkrankung, Haut

Psoriasis	Vorgehen	Akzeptieren, falls leichte Form, nicht im Bereich der Einstichstelle und keine systemische Behandlung. Rückweisung für 6 Monate nach Absetzen einer Behandlung mit Methotrexat. Rückweisung für 3 Jahre nach Absetzen der Behandlung mit Acitretin (Neotigason®). Ausschluss, falls generalisiert und schwerwiegend.
	Siehe auch	Hautverletzung
Erkrankung, Haut	Vorgehen	Akzeptieren bei Hauterscheinungen einer Krankheit mit genetischer Empfänglichkeit (Neurodermatose, Psoriasis, Ekzem, etc.), falls die Haut an der Venenpunktionsstelle gesund ist und der Spender nicht mit potentiell teratogenen Medikamenten behandelt wird. Rückweisung je nach Ursache, falls generalisierte Hautkrankheit.
	Siehe auch	Ekzem Lyme-Krankheit Psoriasis ~~Verletzung~~ Hautverletzung Erisypel
Laserbehandlung Haut	Definition	Anwendung eines Lasers auf einer intakten Hautfläche zur paramedizinischen oder kosmetischen Zwecken z.B. Entfernung von Hautflecken, Tattoos, Haarentfernung.
	Vorgehen	Akzeptieren wenn Haut intakt und reizlos. Rückweisung in allen anderen Fällen.
	Siehe auch	~~Wunde~~ Hautverletzung
Kontakt mit Fremdblut	Definition	und/oder Nadelstichverletzung, Blutkontakt mit Schleimhaut oder verletzter Haut.
	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
	Siehe auch	Spitalpersonal ~~Verletzung~~ Hautverletzung
Postexpositionsprophylaxe PEP und Prä-expositionsprophylaxe PrEP	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach Ende der PEP / PrEP-Behandlung mit oralen Medikamenten zum Schutz vor HIV.~~.~~ Rückweisung für 2 Jahre nach Ende einer PrEP- Behandlung mit injizierten Medikamenten zum Schutz vor HIV.

	Siehe auch	Immunobiotherapie
HIV	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate • nach Aufenthalt in Ländern mit erhöhter HIV-Rate für 6 Monate oder länger. Ausschluss bei: • nachgewiesener HIV Infektion; • Injektion von Drogen (früher oder gegenwärtig). Siehe "Informationsblatt für BlutspenderInnen". Siehe Anhang Art. 7.2: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.
	Siehe auch	Prostitution, Sexworker Sexualverkehr unter dem Einfluss von synthetischen Drogen; Chem-Sex Sexuelle Kontakte, Intimpartner Postexpositionsprophylaxe PEP und Prä-expositionsprophylaxe PrEP
Allergie	Definition	Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen) sind unangemessene Reaktionen des Immunsystems auf eine normalerweise harmlose Substanz. Schweregrad und Art der Symptome: • Grad 1: Juckreiz, Rötung, Urtikaria, Schwellung • Grad 2: Grad 1, Rhinorrhö (Naselaufen), Heiserkeit, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Anstieg der Herzfrequenz, Blutdruckabfall, Rhythmusstörung. • Grad 3: Grad 1, Erbrechen, Schwellung der Atemwege, Bronchospasmus, Schock • Grad 4: Grad 1, Erbrechen, Atemstillstand, Kreislaufstillstand
	Vorgehen	Akzeptieren, falls aktuell keine oder nur leichte Symptome (Grad 1) mit oder ohne Behandlung (lokal, Antihistaminika, Inhalativa). Rückweisung, falls Grad 2 Symptome bis nach Abklingen der Symptome. Rückweisung, falls Behandlung mit oralen Kortikosteroiden bis 2 Wochen nach Therapieende. ~~Rückweisung, falls Behandlung mit Immunsuppressiva (z.B. monoklonaler Antikörper (Anti-IgE)) bis 1 Jahr nach Therapieende.~~ Rückweisung, falls Grad 3- oder Grad 4 Symptome bis 2 Wochen nach vollständiger Genesung. Rückweisung, falls Kontaktallergie auf bei der Blutspende verwendete Materialien (Hautdesinfektion, Handschuhe, Pflaster) falls keine andere Alternative vor Ort vorhanden ist.

Spondylitis ankylosans	Vorgehen	~~Rückweisung für 12 Monate nach Therapie mit monoklonalen Antikörpern.~~ Rückweisung für 24 h nach der letzten Einnahme vonMedikamenten mit Misoprostol (Arthrotec®, teratogen). Ausschluss nur, falls Hinweise für kardio-vaskuläre Beteiligung.
Monoklonale Antikörper (Behandlung)	Definition	Monoklonale Antikörper (mAb) sind biotechnologisch hergestellte Proteine, die hochspezifisch an Zielstrukturen binden, um Krankheiten wie Krebs, Autoimmunerkrankungen oder Migräne zu behandeln. Fast alle dieser Medikamente enden auf -mab.
	Vorgehen	Akzeptieren wenn: • die Grunderkrankung dies erlaubt, • das Medikament gut vertragen wird, • der Spender asymptomatisch ist und der Spender kein erhebliches Risiko für eine Immunsuppression aufweist
~~Schilddrüsenüberfunktion~~	~~Gehe zu~~	~~Hyperthyreose~~
Schilddrüsenentzündung	~~Gehe zu~~	~~Autoimmunthyreoiditis~~
	Vorgehen	Rückweisung bei bakterieller oder viraler Ursache bis zur vollständigen Genesung und wenn der Spender frei von Symptomen ist.
	Siehe auch	Hyperthyreose / Schilddrüsenüberfunktion Hypothyreose / Schilddrüsenunterfunktion
Autoimmunthyreoiditis	~~Vorgehen~~Gehe zu	Hyperthyreose oder Hypothyreose • ~~Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und wenn der Spender frei von Symptomen ist.~~
Struma / Kropf	~~Gehe zu~~ Siehe auch	Hyperthyreose Hypothyreose
~~Kropf~~	~~Gehe zu~~	~~Hyperthyreose~~
Hyperthyreose / Schilddrüsenüberfunktion	Definition	Schilddrüsenüberfunktion, bei der die Schilddrüse zu viele Schilddrüsenhormone produziert, was zu einem beschleunigten Stoffwechsel und einer erhöhten Aktivität zahlreicher Organsysteme (z. B. Herzrhythmusstörungen) führt.
	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach Abschluss der Behandlung (thyreostatische Medikamente, Thyreoiddektomie oder Radiojodtherapie) bei euthyreoter Stoffwechsellage (mit und ohne Substitutionstherapie) und asymptomatisch. ~~Rückweisung für 6 Monate nach Thyreoidektomie oder Radiojodtherapie.~~ ~~Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls Behandlung mit Thyreostatika (z. B. Neo-mercazole).~~

	Siehe auch	~~Autoimmunthyreoiditis~~ Krebs
Morbus Basedow (Graves- disease)	Gehe zu	Hyperthyreose
Hypothyreose / Schilddrüsenunterfunktion	Zu beachten	Nach Komplikationen, z. B. Angina pectoris, fragen.
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn unter Substitutionstherapie gut eingestellt und asymptomatisch.
	~~Siehe auch~~	~~Autoimmunthyreoiditis~~
~~Schilddrüsenunterfunktion~~	~~Gehe zu~~	~~Hypothyreose~~
Zeckenstich	Vorgehen	Rückweisung für 4 Wochen nach Zeckenstich, falls ohne Symptome.
	Siehe auch	Lyme-Krankheit / Borreliose Zeckenenzephalitis (FSME) Rickettsiose
~~Borreliose~~	~~Siehe auch~~	~~Lyme-Krankheit~~ ~~Zeckenstich~~
Lyme-Krankheit / Borreliose	Vorgehen	Akzeptieren, wenn ohne Symptome, auch bei positivem Antikörper-Nachweis. Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. ~~Akzeptieren, wenn positiver Antikörper-Nachweis ohne Symptome~~ ~~Rückweisung für 2 Wochen nach erfolgreicher Behandlung und vollständiger Genesung.~~ ~~Ausschluss, falls chronische Infektion~~.

Alter	Zu beachten	Die Apherese Spender im Alter von 65-75 Jahren sollten zugelassen werden, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: • Erfahrene Spender Jährliche medizinische Freigabe grundsätzlich wie bei älteren VB Spendern. Insbesondere sollte die Freigabe von Apherese Spendern auf der Grundlage eines Interviews und/oder des standardisierten Fragebogens erfolgen.

~~Alter (Jahre)~~	~~Spendeart~~	~~Ärztlicher Entscheid~~	~~Fragebogen 558 «Spender über 65» oder gleichwertiger Fragebogen~~
~~18 - 65~~	~~Vollblut~~	~~-~~	~~-~~
~~18 - 65~~	~~Apherese~~	~~-~~	~~-~~
~~≥60~~	~~Erste Spende~~	~~x~~	~~-~~
~~≥ 60~~	~~Wechsel von Vollblut zur Apherese~~	~~x~~	~~-~~
~~65 - 75~~	~~Vollblut Mehrfachspender~~ ~~Apherese erfahrene Spender~~	~~x; jährlich~~ ~~wobei 4 Mal während einer Periode von 10 Jahren entweder ein persönliches Gespräch oder eine Beurteilung des Fragebogens 558 oder eines gleichwertigen Fragebogens durch den Arzt des RBSD durchgeführt werden muss.~~	~~x~~

<table>
<tr><td></td><td>Vorgehen</td><td>
<table>
<tr><th>Alter</th><th>Spendeart</th><th>Vorgehen</th></tr>
<tr><td>< 18</td><td>Vollblut und Apherese</td><td>Rückweisen</td></tr>
<tr><td>18-59</td><td>Vollblut und Apherese</td><td>Akzeptieren</td></tr>
<tr><td>60 - 75</td><td>Vollblut (Erstspende)

Wechsel von Vollblut zu Apherese</td><td>Akzeptieren mit ärztlichem Entscheid</td></tr>
<tr><td>65 - 75</td><td>Vollblut und Apherese (Mehrfachspender)</td><td>Akzeptieren mit jährlichem ärztlichem Entscheid und wobei 4 Mal während einer Periode von 10 Jahren entweder ein persönliches Gespräch oder eine Beurteilung des Fragebogens 558 oder eines gleichwertigen Fragebogens durch den Arzt des RBSD durchgeführt werden muss.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Botox Behandlung</td><td>Definition</td><td>Therapie mit Botulinumtoxin (Injektion). Wird beispielsweise zur Behandlung von Gesichtsfalten oder bei Hyperhidrose eingesetzt.</td></tr>
<tr><td></td><td>Vorgehen</td><td>Akzeptieren, wenn kein Hinweis auf eine Infektion.</td></tr>
<tr><td>Akupunktur</td><td>Vorgehen</td><td>Akzeptieren.

Rückweisung für 4 Monate, falls Zweifel bezüglich steriler Arbeitstechnik oder Anzeichen für einen bakteriellen Infekt bestehen oder die Akupunktur nicht durch eine medizinische Fachperson mit Einwegnadel durchgeführt wurde.</td></tr>
<tr><td>Microneedling / Mesotherapie</td><td>Definition</td><td>Verfahren der kosmetischen Dermatologie, Perforation der Haut und Erzeugung von Mikroläsionen soll Reparatur- und Wachstumsprozesse auslösen. Die Mesotherapie arbeitet mit Wirkstoff-Injektionen.</td></tr>
</table>

	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
Vampire Lifting	Definition	Eigenblutinjektionen im Gesicht als kosmetische Behandlung. Aufbereitetes eigenes Blut (PRP - Platelet Rich Plasma) wird in die Haut injiziert.
	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
Kosmetische Behandlungen	Siehe auch	Microneedling / Mesotherapie Microblading/ Mikroblading Botox Behandlung Vampire Lifting
Body Modification	Definition	Implantate unter der Haut, die Konturen, Muster oder Erhebungen erzeugen: z.B. Dermal Anchors, Skin Diver, Silikon-Subdermals (Hörner, Sterne), Magnet-Implantate. Gleiches Vorgehen für: Cutting/Branding für Schmucknarben, Tongue Splitting (Zungenspaltung).
	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK/ CJD)	Definition /Vorgehen	Eine Form der übertragbaren spongiformen Enzephalopathie (TSE). Sie führt aufgrund abnormal gefalteter Eiweisse (Prionen) zu einer Degeneration des ZNS und einer rasch progredienten Demenz. Ausschluss • bei Hirnhaut- (Dura Mater) oder Hornhauttransplantation (Keratoplastik) • bei Behandlung mit Hypophysenhormonen aus menschlichem Gewebe (wurden bis 1.1.1986 angewendet)~~menschlicher Herkunft~~ • bei einem familiären Risiko für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder einer anderen übertragbaren spongiformen Enzephalopathie • bei einer CJK-Familienanamnese besteht die Vermutung eines familiären Risikos, es sei denn, es wird festgestellt, dass: 1. das betroffene Familienmitglied die variante Form der CJK hatte, nicht fCJK; oder 2. das betroffene Familienmitglied keine genetische Verwandtschaft mit dem Spender hatte; oder 3. die Ursache der CJK bei dem betroffenen Familienmitglied iatrogen war; oder 4. der Spender wurde getestet und hat bekanntermassen einen normalen genetischen Polymorphismus für PrPc.
Wachstumsstörung	Vorgehen	Ausschluss, bei Behandlung mit Hypophysenhormonen aus menschlichem Gewebe (wurden bis 1.1.1986 angewendet)~~Therapie mit Hormonen, die aus menschlichen Geweben hergestellt wurden.~~

Hormonsubstitu-tions-therapie	Vorgehen	Akzeptieren, falls Behandlung von Menopausebeschwerden oder von Osteoporose mit Hormonpräparaten. Ausschluss bei Behandlung mit Hypophysenhormonen aus menschlichem Gewebe (wurden bis 1.1.1986 angewendet)~~nach Behandlung mit Gonadotropinen (Hor-monen zur Behebung von Unfruchtbarkeit) aus Hypo-physen.~~
Tuberkulose, Kontakt	~~Gehe zu~~	~~Mantoux-Probe~~
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung kein Test (Mantoux-Probe oder IGRA-/Quantiferon-Test) auf Tuberkulose durchgeführt wurde und keine Therapie notwendig war. Akzeptieren, wenn im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung ein Test (Mantoux-Probe oder IGRA-/Quantiferon-Test) auf Tuberkulose gemacht wurde und dieser negativ war oder bei positivem Test keine Behandlung durchgeführt wurde. Rückweisung für 2 Wochen nach Abschluss einer präventiven Antibiotika Behandlung. Rückweisung bei regelmässigem Kontakt mit Patienten mit aktiver Tuberkulose.
~~Mantoux-Probe~~	~~Vorgehen~~	~~Rückweisung bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, jedoch mindestens 1 Woche nach Injektion des Tuberkulins.~~
	~~Siehe auch~~	~~Tuberkulose~~
Tuberkulose	Definition	Wird durch das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis* ausgelöst. Die Erreger werden meistens über Tröpfcheninfektion übertragen. Am häufigsten ist die Lunge betroffen, die Krankheit kann aber auch andere Organe befallen.
	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre nach Beendigung jeglicher Nachsorge und Absetzen aller Medikamente. Ausschluss, falls Rückfall unter Behandlung.
	Siehe auch	~~Mantoux-Probe~~ Tuberkulose, Kontakt
Arthritis	Vorgehen	Rückweisung bei akuter Form. Rückweisung bei Behandlung mit steroidalen Antirheumatika. Rückweisung für 6 Monate nach Absetzen einer Behandlung mit Methotrexat. Rückweisung für 24 h nach der letzten Einnahme von Misoprostol (Arthrotec®, teratogen). Ausschluss bei schwerwiegender Erkrankung mit Behandlung.
	Siehe auch	Rheumatisches Fieber Spondylitis ankylosans

Arthrose	Vorgehen	Rückweisung, falls akute Phase. Rückweisung für 24 h nach der letzten Einnahme von Misoprostol (Arthrotec®, teratogen).
Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte	Vorgehen	Akzeptieren von Spitalpersonal, das Patienten mit Hepatitis betreut oder in Krankenhauslabors arbeitet, vorausgesetzt, dass die Betreffenden keine Stichverletzung mit Blutkontamination haben. Rückweisung für 4 Monate nach: • Tätowierung; • Semi-permanentem Make-up; • Endoskopie mit flexiblen Instrumenten; • Kontakt mit Fremdblut (Nadelstichverletzung oder Blutkontakt mit Schleimhaut oder verletzter Haut); • Gabe von Hepatitis-B-Immunglobuline zur Postexpositionsprophylaxe (passive Immunisierung, z.B. Nach Stichverletzung) Rückweisung für 6 Monate : • nach letztem engem Haushaltskontakt mit Wohnpartner/in mit HBV. ~~Rückweisung für 12 Monate :~~ • ~~Spender, die nach einer Stichverletzung Hepatitis-B-Ig erhalten haben~~
	Siehe auch	Akupunktur Endoskopie Hepatitis B, Haushaltskontakt Hepatitis B, Sexualpartner Hepatitis C, Sexualpartner Kontakt mit Fremdblut Sexuelle Kontakte, Intimpartner Spitalpersonal Tätowierung / Tattoo