

Kapitel 17D / Anhang Art. 7.3

Vaccine Check - Impfcheck

Gültig ab: 17.12.2024
Version 7

Für die Blutstammzellspende (CT/VT und MC) gelten die gleichen Fristen wie für die Blutspende
(Entnahme: kontaktiere SBSC).

Legende hinzugefügt verändert gelöscht

Toxoide und inaktivierte oder proteinbasierte oder nicht replikationsfähige vektorbasierte oder mRNA Impfstoffe

COVID-19	Comirnaty ® von Pfizer/BioNTech	48 Stunden
COVID-19	COVID-19 Vaccine Moderna ®, Spikevax®	48 Stunden
COVID-19	COVID-19 Vaccine Janssen, Johnson & Johnson	48 Stunden
COVID-19	Nuvaxovid von Novavax	48 Stunden
Cholera	Dukoral®	48 Stunden
Diphtherie (einzeln oder kombiniert)		48 Stunden
Gebärmutterhalskrebs / Genitalwarzen (Humanes Papillomavirus/HPV)	Gardasil®, Cervarix®	48 Stunden
Grippe (saisonale Influenza)		48 Stunden
Hepatitis A (einzeln oder kombiniert)	Einzeln oder kombiniert	2 Wochen
Hepatitis B (einzeln oder kombiniert)	Einzeln oder kombiniert	2 Wochen
Herpes genitalis	Lupidon®	48 Stunden
Hirnhautentzündung (durch Haemophilus influenzae Typ b)		48 Stunden
Hirnhautentzündung durch Meningokokken (Meningokokken- Meningitis)		48 Stunden
Japanische Enzephalitis	Ixiaro®	48 Stunden
Keuchhusten (Pertussis) (einzeln oder kombiniert)		48 Stunden
Kinderlähmung (Poliomyelitis, parenteraler Impfstoff nach Salk) (einzeln oder kombiniert)		48 Stunden
Lungenentzündung durch Pneumokokken (Pneumokokken- Pneumonie)		48 Stunden
Milzbrand (Anthrax)		48 Stunden
RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus)	Arexvy®, Abrysvo®	48 Stunden
Starrkrampf (Tetanus) (einzeln oder kombiniert)		48 Stunden
Tollwut (Rabies)	Rabipur®	48 Stunden
Varicella-Zoster (Gürtelrose)	Shingrix®	48 Stunden
Zecken-Meningoencephalitis	FSME-Immun®, Encepur N®	48 Stunden

Lebende abgeschwächte oder replikationskompetente vektorbasierte Impfstoffe

Affenpocken (Mpox), Pocken	Jynneos®	4 Wochen
Dengue-Fieber	Qdenga®	4 Wochen
Gelbfieber	Stamaril®	4 Wochen
Gürtelrose (Herpes zoster)	Zostavax®	4 Wochen
Masern-Mumps-Röteln		4 Wochen
Masern-Mumps-Röteln-Windpocken	Proquad®	4 Wochen
Rotavirus	Rotarix®	4 Wochen
Röteln (einzeln oder kombiniert)		4 Wochen
Tuberkulose (BCG)		4 Wochen
Typhus / Paratyphus (oral)	Vivotif®	4 Wochen
Windpocken (Varizellen)		4 Wochen

Passive Immunisierung post-Exposition (Immunglobuline)

Starrkrampf (Tetanus)	Tetagam®	12 Monate
Tollwut (Rabies)	Berirab®	12 Monate

Impfstoff mit Humanalbumin

Tollwut (Rabies)	Tollwut-Impfstoff Mérieux®	12 Monate
------------------	----------------------------	-----------

Gelöschte Impfungen

Cholera

Nicht zugelassene Impfstoffe

Rückweisung 12 Monate
