Allegato Art. 7.3
Vaccine Check - Check vaccinale

BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Valido da: 01/02/2027
Version 8

Per la donazione di cellule staminali (CT/VT e MC) si applicano gli stessi termini di rinvio della donazione di sangue (prelievo: contattare SBSC).
Le immunizzazioni passive (somministrazione di anticorpi dopo un'esposizione) non sono riportate nel check vaccinale. Sono indicate nell'allegato, art. 7.1 CIT di/dopo assunzione medicinali, alla voce Bio-immunologici.

Legenda | aggiunto | modificato | annullato

Tossoidi e vaccini inattivati o a base proteica o basati su vettori non replicativi o vaccini mRNA

COVID-19	Comirnaty® , COVID-19 Vaccine Janssen Johnson & Johnson , COVID-19 Vaccine Moderna ®, Nuvaxovid®, Spikevax®	48 ore
COVID-19	Comirnaty® , Nuvaxovid®, Spikevax®	48 ore
Cancro cervicale / verruche genitali (virus del papilloma umano / HPV)	Gardasil® 9, Cervarix®	48 ore
Cancro cervicale / verruche genitali (virus del papilloma umano / HPV)	Gardasil® 9	48 ore
Carbonchio (Antrace)		48 ore
Chikungunya	Vimkunya®	48 ore
Colera	Dukoral®	48 ore
Difterite (singolo o combinato)		48 ore
Encefalite giapponese	Ixiaro®	48 ore
Epatite A (singolo o combinato)	Singolo o combinato	2 settimane
Epatite A e/o epatite B (singolo o combinato)		2 settimane
Epatite B (singolo o combinato)	Singolo o combinato	2 settimane
Herpes genitale	Lupidon®	48 ore
Influenza (stagionale)		48 ore
Meningite (causata da Haemophilus influenzae tipo b)		48 ore
Meningite causata da meningococchi (meningite meningococcica)		48 ore
Meningoencefalite da zecche	FSME-Immun®, Encepur N®	48 ore
Pertosse (singolo o combinato)		48 ore
Polio (Poliomielite, vaccino parenterale di Salk) (singolo o combinato)		48 ore
Polmonite causata da pneumococchi (polmonite da pneumococco)		48 ore
RSV (Virus respiratorio sinciziale)	Abrysvo® , Arexvy®	48 ore
Rabbia	Rabipur®	48 ore
Rabbia	Rabipur®, Vaccino antirabbico Mérieux®	48 ore
Tetano (singolo o combinato)		48 ore
Herpes zoster (virus varicella-zoster)	Shingrix®	48 ore

Vaccini vivi attenuati o basati su vettori replicativi

Febbre dengue	Qdenga®	4 settimane
Febbre gialla	Stamaril®	4 settimane
Herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio)	Zostavax®	4 settimane
Morbillo-parotite-rosolia (MPR)		4 settimane
Morbillo-parotite-rosolia-varicella (MPRV)	Proquad®	4 settimane
Rosolia (singolo o combinato)		4 settimane
Rotavirus	Rotarix®	4 settimane
Tifo / Paratifo (orale)	Vivotif®	4 settimane
Tubercolosi (BCG)		4 settimane
Vaiolo delle scimmie (Mpox), Vaiolo	Jynneos®	4 settimane
Varicella		4 settimane

Immunizzazione passiva post-esposizione (immunoglobuline) (non farà più parte del Vaccine Check – controllo vaccinale a partire dal 01/02/2027)

Rabbia	Berirab®	12 mesi
Tetano	Tetagam®	12 mesi

Vaccino contenente albumina umana

Rabbia	Vaccino antirabbico Mérieux®	12 mesi

Vaccini non autorizzati

Periodo di attesa di 12 mesi

Realizzato il: 19/10/2026 08:59