



HAV

Si tratta di una determinazione non obbligatoria e non significativa per il rilascio. I risultati HAV positivi vengono gestiti come le informazioni post-donazione. Le donazioni interessate saranno distrutte o, se i prodotti sono già stati consegnati, gli ospedali interessati saranno informati e invitati a distruggere o a restituire i prodotti, se disponibili. In caso di test NAT positivo (qualitativo), il donatore sarà rinviato in base ai criteri di attitudine ([allegato articolo 7](#)). In caso di una "donazione X meno 1" di meno di 4 settimane, sarà eseguito un test HAV-NAT individuale sul campione d'archivio. Per gli ospedali è stata preparata una raccomandazione per la formulazione delle informazioni post-donazione ([vedi articolo 18](#)).

Parvo B19

Si tratta di una determinazione non obbligatoria e non significativa per il rilascio. I risultati Parvo B19 positivi vengono gestiti come informazioni post-donazione. Le donazioni interessate vengono distrutte o, se i prodotti sono già stati consegnati, gli ospedali interessati vengono informati e invitati a distruggere o a restituire i prodotti, se disponibili. In caso di test NAT positivo (quantitativo), le donazioni precedenti effettuate nelle ultime 12 settimane vengono distrutte o richiamate. Per gli ospedali è stata preparata una raccomandazione per la formulazione delle informazioni post-donazione ([vedi articolo 18](#)).