

Infezione	Quadro infettivo nel donatore	Quadro infettivo nel ricevente
HIV	Segni clinici al momento della donazione e/o entro 6 mesi dalla sieroconversione e/o HIV NAT pos.	Segni clinici di infezione recente entro 6 mesi dalla somministrazione degli emoderivati e/o
		Sieroconversione anti-HIV e/o HIV RNA entro 6 mesi dalla somministrazione degli emoderivati.
HBV	Segni clinici di infezione recente al momento della donazione e/o successivamente HBV NAT pos. e/o presenza di IgM anti-HBc e/o sieroconversione di anti-HBs senza vaccinazione e/o anti-HBc confermato senza anti-HBs e/o HBsAg positivo al riesame.	Segni clinici di infezione recente da HBV entro 6 mesi dalla somministrazione degli emoderivati e/o;
	Segni clinici di infezione cronica al momento della donazione o durante l'esame di look back.	Comparsa di HBsAg e/o sieroconversione di anti-HBc e/o presenza di IgM anti-HBc e/o HBV DNA entro 6 mesi dalla somministrazione degli emoderivati.
HCV	Segni clinici al momento della donazione e/o entro 6 mesi dalla sieroconversione e/o HCV core Ag e/o HCV NAT pos.	Segni clinici di infezione recente da HCV fino a 6 mesi dopo la somministrazione degli emoderivati e/o;
		Sieroconversione anti-HCV entro 6 mesi e/o;
		Comparsa di HCV RNA entro 6 mesi dalla somministrazione degli emoderivati.