

Modalités de prélèvement (GPG)

Don de sang complet	Quantité totale prélevée et délai minimal entre 2 prélèvements	Risques et mesures de précaution	Laboratoire
	<p>< 15% du volume sanguin total par séance (cf. Spécifications produits correspondants)</p> <p>Délai entre 2 dons de sang complet : 10 semaines (généralement, 3 fois/an chez la femme, 4 fois/an chez l'homme).</p> <p>Voir aussi l'hémochromatose à l'Annexe Art. 7.5 Critères d'aptitude.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hématome localisé au(x) point(s) de ponction : 12.5% • Réaction vaso-vagale : 2.5% • Irritation cutanée allergique : 0.5% • Hématome au cours du don : 0.3% • Réaction vaso-vagale avec syncope : 0.2% • Hématome post-don : < 0.1% <p>Incidents rares : angor, compartiment syndrome, fistule artério-veineuse, ictus, infarctus du myocarde, infection du point de ponction, pseudo-anévrisme artériel, thrombophlébite.</p> <p>Ne pas accepter si le donneur est à jeun.</p> <p>Dernière ingestion de liquide < 4 heures.</p>	

Aphérèse

<p>Plasmaphérèse</p>	<p>16% du volume sanguin total et max. 750 ml par séance sans compensation.</p> <p>Maximum : 15 l/an.</p> <p>Délai minimal entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 plasmaphérèses : 2 semaines • don de sang complet-aphérèse : 1 semaine • plasmaphérèse-don de sang complet : 48 heures 	<p>Si le volume maximum de 750 ml ou > 16% du volume sanguin total par séance est dépassé, une compensation doit être administrée.</p> <p>Ces restrictions ne peuvent être levées que dans des conditions spéciales et sous la responsabilité du médecin.</p> <p>En cas de problème technique avec impossibilité de retour au donneur des érythrocytes prélevés, le don de plasma est considéré comme un don de sang complet.</p>	<p>Lors de la 1^{ère} plasmaphérèse et au moins 1 fois/an : dosage des protéines totales > 60 g/l.</p>
<p>Thrombocythaphérèse</p>	<p>16% du volume sanguin total et max. 750 ml par séance sans compensation.</p> <p>Maximum : 12 dons/an.</p> <p>Délai minimal entre 2 thrombocythaphérèses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • programmées : 2 semaines • en situation exceptionnelle : (p. ex. groupe HLA/HPA spécifique) : 1 semaine pour un cycle de 5 aphérèses au maximum (des écarts sont possibles dans des situations exceptionnelles médicales et à la discrétion du médecin). <p>Thrombocythaphérèse - don de sang complet/de CE : 48 heures,</p> <p>Don de sang complet/de CE resp. thrombocythaphérèse : 4 semaines.</p>	<p>Si le volume maximum de 750 ml par séance ou 16% du volume sanguin total est dépassé, une compensation doit être administrée.</p> <p>Au cours des 5 jours précédant la thrombocythaphérèse, le donneur ne doit pas absorber d'acétylsalicylate ni d'autres médicaments figurant sur la liste des antiagrégants plaquettaires.</p>	<p>Lors de chaque thrombocythaphérèse : contrôle du nombre de plaquettes : 150 - 500 x 10⁹/l.</p>

<p>Aphérèse combinée</p> <p>Définition : prélèvement chez un même donneur de plusieurs composants sanguins p. ex : 1 PFC + 1 CE ; 1 PFC + 1 CP ; 1 CE + 1 CP ; etc. par aphérèse.</p>	<p>16% du volume sanguin total et max. 750 ml au total (CE, CP, Plasma) par séance sans compensation.</p> <p>Délai minimum entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dons de 1 CE : 10 semaines (idem don de sang complet). 	<p>Si le volume maximum de 750 ml ou 16% du volume sanguin total par séance est dépassé, une compensation doit être administrée.</p>	
<p>Erythrocytaphérèse</p> <p>Définition : prélèvement de 2 CE en 1 seule séance chez le même donneur.</p>	<p>La quantité annuelle maximale de globules rouges prélevée est identique à celle autorisée pour des dons de sang complet.</p> <p>Délai minimum entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • don de sang complet-érythrocytaphérèse : 3 mois au moins. • érythrocytaphérèse-don de sang complet/ 2 érythrocytaphérèses : 6 mois au moins. <p>Possibilité de réduire l'intervalle entre 2 dons sous stricte surveillance et responsabilité du médecin.</p>	<p>Volume sanguin estimé > 5 litres (condition généralement remplie si poids > 70 kg et taille > 165 cm).</p>	<p>Taux minimal d'hémoglobine : 140g/l.</p>