 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Kapitel 17 B: Critères d'aptitude au don de sang

RÉFÉRENCES

1. Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) – version en vigueur
2. Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins - Conseil de l'Europe - version en vigueur

Documentation et principes généraux

Les critères d'aptitude au don de sang sont un instrument de travail visant à assurer la sécurité du donneur lors du don d'une part et celle du receveur d'autre part. Ils s'appliquent aux donneurs de sang complet, de plaquettes et de plasma à usage thérapeutique.

Ils sont classés par ordre alphabétique dans le présent document (accessible sur le site internet de T-CH SA), que complètent des listes de médicaments, de vaccins et de Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses, ainsi que certaines règles de prélèvement.

Ils sont régulièrement actualisés conformément aux exigences européennes [2] par le groupe de travail compétent puis implémentés par la Direction médicale de la T-CH SA. La version disponible sur le site internet est actualisée en permanence.


Les donneurs sont évalués par un personnel formé à cet effet sous la responsabilité d'un médecin des SRTS. En cas de doute concernant l'aptitude potentielle du candidat-donneur, le personnel ne doit pas accepter le don et doit se référer au médecin du SRTS qui procède alors à une évaluation individuelle. Tout problème lors de l'anamnèse ou de l'examen clinique pré-don doit être interprété conformément aux critères ci-après. Dans le cas où le donneur n'est pas éligible au don, une explication détaillée de la contre-indication et de ses conséquences doit lui être donnée.

Si des donneurs présentent des risques potentiels non cités dans ce chapitre, ils doivent être adressés au médecin du SRTS pour avis. Le cas sera ensuite transmis à la Direction médicale de la T-CH SA pour implémentation éventuelle.


Glossaire

Conduite à tenir (CAT)	
Contre-indication définitive : CID	Mesure illimitée dans le temps irréversible et définitive. Le donneur doit en être informé de manière compréhensible pour lui.
Contre-indication temporaire : CIT	Mesure limitée dans le temps. Le donneur sait quand il sera à nouveau éligible.
Accepter	Le donneur est déclaré apte au don.

Le terme « donneur » est employé indifféremment pour désigner donneuses et donneurs.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Abcès	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet, jusqu'à 2 semaines au minimum après arrêt de l'antibiothérapie.
Abcès cutané	Se référer à	Abcès
Abcès dentaire	Se référer à	Abcès
Abcès périamygdalien	Se référer à	Amygdalite
Ablation de l'utérus	Se référer à	Hystérectomie
Ablation de tumeurs oculaires	À noter	Toutes les ouvertures des méninges impliquent l'exclusion.
	Traitement	Se référer à Chirurgie ophtalmologique
Accident d'exposition au sang	Se référer à	Contact avec du sang étranger
Accident ischémique transitoire (AIT)	Se référer à	Maladie vasculaire cérébrale
Accident vasculaire cérébral (AVC)	Se référer à	Maladie vasculaire cérébrale
Acné	Traitement	<p>Accepter si antibiothérapie par tétracycline/érythromycine ou Roaccutan® Gel.</p> <p>CIT si présence de lésions actives ou infectées.</p> <p>CIT de 4 semaines après la dernière prise d'isotrétinoïne (Curakne®, Isotrétinoïne, Roaccutan® Capsules, Tretinac®), de trétinoïne (Vesanoid®) ou d'alitrétinoïne (Toctino®).</p> <p>CIT de 2 ans après la dernière prise d'étrétinat (actuellement pas autorisé en Suisse).</p> <p>CIT de 3 ans après la dernière prise d'acitrétine (Acicutan®, Neotigason®).</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Acupuncture

Traitement

CIT de 4 mois si la stérilité de la méthode de travail est douteuse, s'il existe des signes d'infection ou si le traitement n'est pas réalisé avec des aiguilles à usage unique par du personnel médical autorisé.


 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Age **À noter** Les donneurs d'aphérèse âgés de 65 à 75 ans peuvent être admis si les conditions suivantes sont remplies:


- Donneurs réguliers
- Autorisation médicale annuelle, équivalente à celle des donneurs de sang complet âgés. L'autorisation des donneurs d'aphérèse devrait être basée sur un entretien et/ou sur un questionnaire standardisé.

Traitement


Age (Années)	Type de don	Décision Médicale REQUISE	Questionnaire 558 «Donneurs plus 65» ou un questionnaire équivalent
18 - 65	Sang complet	-	-
18 - 65	Aphérèse	-	-
≥ 60	Premier don	x	-
≥ 60	Changement du sang complet à l'aphérèse	x	-
65 - 75	Sang complet donneurs réguliers Aphérèse donneurs experts	x; annuelle-ment ou 4 fois sur une période de 10 ans, soit un entretien personnel, soit une évaluation du questionnaire 558 ou un questionnaire équivalent doit être effectué par le médecin du SRTS.	x

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Aiguilles	Voir aussi	Contact avec du sang étranger Personnel hospitalier Piercing Tatouage/ Tattoo
Alcool	Traitement	CIT si ivresse aiguë.
Allergie alimentaire	Définition	Réaction allergique à un aliment particulier.
	Traitement	Se référer à Maladies allergiques.
Allergie médicamenteuse	Se référer à	Maladies allergiques
Amibiase	Traitement	CIT jusqu'à disparition des symptômes cliniques et la fin du traitement d'une forme intestinale.
		CIT de 6 mois après la fin du traitement d'une forme viscérale.
Amygdalectomie	Traitement	CIT d'1 mois après rétablissement complet et 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Amygdalite	Traitement	CIT après rétablissement complet et 2 semaines au moins après arrêt de l'antibiothérapie.
Anaphylaxie	Définition	Réaction allergique aiguë potentiellement fatale et qui survient chez une personne sensibilisée quand elle est réexposée à l'allergène (antigène). Les symptômes correspondent aux grades 3 et 4 (cf. maladies allergiques).
	Traitement	CIT de 2 semaines après rétablissement complet. CID >si récurrence (dès le second épisode anaphylactique, quel que soit l'intervalle entre les deux épisodes).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Anémie falciforme	Définition	Drépanocytose. Maladie héréditaire liée à la synthèse d'hémoglobine anormale (HbS), qui entraîne une anémie hémolytique.
	Traitement	CID.
Anémie hémolytique	Traitement	CID.
Anémie sidéropénique/ferriprive	À noter	Adapter éventuellement la fréquence des prélèvements.
	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS.
	Voir aussi	Hémoglobine
Anémie, par carence en vit B12 ou acide folique	À noter	Faire préciser l'origine.
	Traitement	CIT jusqu'à l'arrêt du traitement et reconstitution des réserves. CID si une substitution permanente est nécessaire.
Anesthésie générale	À noter	Une anesthésie ne doit pas être considérée comme une cause de CI.
	Traitement	CIT dépendant de la nature de l'intervention et de l'état de santé du donneur. En cas de doute, en référer au médecin du SRTS.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Anesthésie locale	Se référer à	Anesthésie générale
Anévrisme	Traitement	CID.
Angine	Se référer à	Amygdalite

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Angine de poitrine	Définition	Douleur thoracique lors de maladie des artères coronaires (MAC).
	Traitement	CID.
Angor	Se référer à	Angine de poitrine
Anneau gastrique	Se référer à	Chirurgie viscérale
Anticoagulant, traitement	À noter	Demander quelle est la maladie sous-jacente.
	Traitement	<p>Accepter après administration préventive unique.</p> <p>CIT d'1 mois après la dernière prise d'anticoagulants oraux, si le principe actif n'est pas tératogène (liste des principes actifs tératogènes : cf. article 7, annexe 7.1).</p> <p>CIT d'1 mois après la fin du traitement anticoagulant (si sous cutané).</p> <p>CIT de 3 mois après la dernière prise, si le principe actif est tératogène ou inconnu. Anticoagulants tératogènes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • phénprocoumone (Marcoumar®) • acénocoumarol (Sintrom®) • warfarine (Coumadine®) • fluindione (Previscan®)
	Voir aussi	<p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p> <p>Embolie pulmonaire</p> <p>Fracture simple</p> <p>Thrombose, artérielle</p> <p>Thrombose, veineuse profonde</p> <p>Thrombose, veineuse superficielle</p> <p>Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)</p>
Anxiété	Se référer à	Trouble panique
Apoplexie	Se référer à	Maladie vasculaire cérébrale

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Appendicectomie	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Artériosclérose, y c. maladie des artères coronaires (MAC)	Traitement	CID si: <ul style="list-style-type: none"> • maladie coronarienne (y c. angine de poitrine), • infarctus du myocarde • antécédents de bypass / stent ou d'angioplastie coronaire par laser • anévrisme artériel • artériopathie périphérique oblitérante • thrombose artérielle après dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral (AVC, ou «attaque cérébrale») • accident ischémique transitoire (AIT).
Artérite temporale	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS.
Arthrite	Traitement	CIT si poussée aiguë. CIT si traitement par anti-inflammatoires stéroïdiens. CIT de 6 mois après arrêt d'un traitement par méthotrexate. CID si affection grave nécessitant un traitement.
	Voir aussi	Rhumatisme articulaire aigu Spondylarthrite ankylosante
Arthroscopie	Traitement	CIT d'1 mois.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Arthrose	Traitement	CIT si poussée inflammatoire aiguë.
Arythmie	Se référer à	Troubles du rythme cardiaque

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Asthme	Définition	Inflammation des voies respiratoires provoquée par divers facteurs déclencheurs induisant une bronchoconstriction partiellement ou complètement réversible. La symptomatologie comprend une dyspnée, une sensation d'oppression thoracique, une toux et un sifflement.
	Traitement	<p>Accepter si asymptomatique et si une utilisation sporadique d'inhalateurs est nécessaire ou en cas de traitement préventif régulier avec des aérosols (y compris des aérosols de corticostéroïdes).</p> <p>CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement.</p> <p>CIT d'1 mois après une crise aiguë.</p> <p>CID si crises fréquentes ou maladie chronique symptomatique malgré un traitement de corticostéroïde.</p>
Attaque cérébrale	Se référer à	Maladie vasculaire cérébrale
Avortement	Se référer à	Interruption de grossesse
Babésiose	Traitement	CID.
Basaliome	Se référer à	Cancer
Basedow, maladie	Se référer à	Thyroïdite auto-immune
Bechterew, maladie de	Se référer à	Spondylarthrite ankylosante
Besnier-Boeck-Schaumann, Syndrome	Se référer à	Sarcoïdose
Bilharziose	Traitement	CIT d'au moins 12 mois après la fin du traitement et jusqu'à preuve de guérison de la schistosomiase (urine et selles répétitivement négatives et anticorps en baisse ou négatifs après 12 et 24 mois).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Blennorragie	Se référer à	Gonorrhée
Blépharite	Définition	Inflammation du bord de la paupière de différentes causes.
	Traitement	Se référer à: <ul style="list-style-type: none"> • Chalazion (hordéole interne) • Orgelet
Blessure	Traitement	CIT jusqu'à guérison complète (absence de signes d'inflammation cutanée).
	Voir aussi	Chirurgie traumatologique Personnel hospitalier
Blessure à la tête	Se référer à	Traumatisme cranio-cérébral (TCC)
Blessure cutanée	Voir aussi	Blessure Contact avec du sang étranger Piercing Tatouage/ Tattoo
Borréliose	Voir aussi	Lyme, maladie de Tique, piqûre de
Bradycardie	Traitement	Accepter si normalisation lors d'une 2ème prise de la tension (après collation éventuellement) ou si grand sportif ou travailleur de force et absence d'effets secondaires. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si fréquence cardiaque inférieure à 50/min en l'absence de prise de médicaments bradycardisants.
	Voir aussi	Hypertension artérielle
Bronchite aiguë	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Bronchite chronique	Traitement	CID si multirécidives infectieuses hivernales avec toux et expectoration.
Brucellose	Traitement	CIT de 3 mois après absorption d'aliments suspects. CID si infection avérée.
Cancer	Traitement	<p>CIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • jusqu'à guérison complète (cicatrisation complète, retrait du matériel et fermeture de la plaie) post excision d'un basaliome, en l'absence de chimiothérapie ou radiothérapie adjuvante. CIT de 2 ans après la fin du traitement par vismodegib (Eri-vedge®). • d'1 mois après l'opération réussie d'un carcinome in situ du col de l'utérus en l'absence de chimiothérapie ou radiothérapie adjuvante, sinon CID. • de 5 ans après opération d'un carcinome du col de l'utérus en cas de chirurgie plus lourde qu'une conisation ou d'une chirurgie et/ou de chimiothérapie ou radiothérapie, à condition que le donneur soit considéré comme guéri et que la rémission soit complète. • de 5 ans après le dernier acte thérapeutique (intervention chirurgicale, radiothérapie, traitement médicamenteux d'autres tumeurs malignes, p. ex. chimiothérapie, hormonothérapie ou traitement par inhibiteurs du VEGF) pour toutes les autres néoplasies, à condition que le donneur soit considéré comme guéri et en rémission complète. <p>Aptitude au premier don après une affection maligne à déterminer et documenter par le médecin du SRTS.</p> <p>Voir aussi</p> <p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p>
Candidose	Traitement	<p>Accepter seulement si traitement local (localisation vulvo-vaginale/balanite mycosique) et absence de pathologie sous-jacente.</p> <p>CIT jusqu'au rétablissement complet si autre localisation.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Cannabidiol	Traitement	Accepter
Cannabis	Traitement	CIT si sous l'emprise de Cannabis.
	Voir aussi	Drogue, usage de
Cartilage, opération du	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Cataracte	Définition	Opacité du cristallin
	Traitement	Se référer à Cataracte, opération
Cataracte, opération	Définition	Ablation du cristallin.
	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Chirurgie ophtalmologique
Cécité	Traitement	Accepter si le donneur a bien compris la procédure du don de sang et les tests de dépistage des maladies transmissibles, a donné son consentement et que la sécurité lors du don n'est pas menacée. Questionnaire à remplir avec l'aide d'une personne de l'équipe de prélèvement.
Cellules Souches, don de	Traitement	CIT tant que le processus de don est en cours (à partir de la demande de groupage de contrôle). CIT de 12 mois après un don de cellules souches.
Céphalées	Traitement	Accepter en l'absence de symptômes, si céphalées occasionnelles.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Chagas, maladie de	À noter	<p>Les donneurs suivants sont uniquement aptes au don qu'après un résultat négatif d'un test de laboratoire pour la maladie de Chagas (IF ou ELISA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • s'ils sont nés et/ou ont grandi dans une région endémique. • si leur mère a vécu dans une région endémique. • si séjour sans interruption dans une région endémique de Chagas de > 6 mois.
	Traitement	<p>Accepter si séjour dans une région endémique < 6 mois.</p> <p>CID si maladie déclarée ou confirmée par un test de laboratoire anti-T.cruzi positif.</p> <p>Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>
Chalazion (hordéole interne)	Définition	Obstruction non infectieuse d'une glande de Meibom (glande sébacée située au bord des paupières)
	Traitement	Accepter
Chancre mou	Se référer à	Gonorrhée
Chikungunya	Traitement	<p>CIT d'1 mois après voyage en zone endémique.</p> <p>CIT de 4 mois après guérison complète.</p> <p>Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Chirurgicale, intervention (Généralités)

Traitement

CIT :

- jusqu'à guérison complète (et la fin d'un traitement post-opératoire);
- compter 2 semaines supplémentaires après la fin d'un traitement antibiotique;
- compter 1 mois supplémentaire après la fin d'un traitement par anticoagulants (si sous-cutané ou par voie orale, sauf s'ils sont tératogènes);
- compter 3 mois supplémentaires après la dernière prise d'anticoagulants oraux tératogènes;
- de 1 mois après intervention mineure sans complications;
- de 4 mois après la chirurgie dans les pays où les taux de VIH, VHB, VHC sont élevés;
- de 6 à 12 mois après intervention majeure (selon évaluation par le médecin du SRTS).

CIT pendant les 2 mois précédant une intervention chirurgicale programmée sauf si intervention mineure (p.ex. stérilisation, excision d'une verrue etc.).

CID :

- si risque en relation avec une infection à prions (greffe de méninges (dure-mère) respectivement greffe de cornée (kératoplastie));
- après transplantation, sauf si autologue.

En cas d'affection maligne sous-jacente, même traitement que pour le critère "cancer".

Voir aussi

Anesthésie générale

Anticoagulant, traitement

Cancer

Chirurgie neurologique


Colostomie

Endoscopie


Implants

Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)


Transplantation

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Chirurgie cardio-vasculaire	Se référer à	Maladies cardio-vasculaires
Chirurgie cutanée	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités)
Chirurgie gynécologique	À noter	Recherche d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaires en cas de grossesse.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Conisation du col utérin Curetage Fibroadénome du sein, ablation Hystérectomie Interruption de grossesse Myomectomie Prolapsus utérin, opération Sein, biopsie de nodule Stérilisation tubaire Tumorectomie mammaire
Chirurgie neurologique	Traitement	CIT de 12 mois si l'intervention avec ouverture de la dure-mère a été pratiquée en Suisse. CID si l'intervention avec ouverture de la dure-mère a été pratiquée à l'étranger. CID lors d'une greffe de méninges (dure-mère).
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Hernie discale, Opération Laminectomie Spondylodèse

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Chirurgie ophtalmologique	À noter	Il faut toujours demander la raison de l'opération.
	Traitement	CIT d'1 mois
	Voir aussi	Cancer Cataracte, opération Chirurgicale, intervention (Généralités) Glaucome, opération
Chirurgie ORL	Traitement	CIT d'1 mois si chirurgie mineure (amygdales, végétations, sinus, etc.). Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS après chirurgie majeure.
	Voir aussi	Amygdalectomie Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Mastoïde, opération de la
Chirurgie orthopédique	Traitement	CIT d'1 mois Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS en cas d'intervention importante.
	Voir aussi	Cancer Cartilage, opération du Chirurgicale, intervention (Généralités) Fracture, ostéosynthèse Implants Prothèse totale de hanche / de genou
Chirurgie rénale et urologique	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Lithiase rénale, opération Prostatectomie Varicocèle, opération Vasectomie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Chirurgie stomatologique	Traitement	Se référer à: <ul style="list-style-type: none"> • Dentaire, extraction • Dentaire, traitement
Chirurgie thoracique	Traitement	CIT de 6 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités)
Chirurgie traumatologique	Voir aussi	Cartilage, opération du Chirurgicale, intervention (Généralités) Chirurgie orthopédique Fracture simple Ligament, rupture du Polytraumatisme Splénectomie
Chirurgie viscérale	Traitement	CIT d'1 mois lors de petites interventions sans complications, de 6 mois après intervention importante et jusqu'au rétablissement complet. CIT de 3 ans si chirurgie bariatrique (p. ex. anneau gastrique, gastroplastie, méthodes axées sur la malabsorption intestinale, méthodes mixtes de restriction gastrique et de malabsorption intestinale).
	Voir aussi	Appendicectomie Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Cholécystectomie Colostomie Gastrectomie Hémorroïdes, cure chirurgicale Hernie hiatale, Opération Hernie inguinale, Opération Iléostomie Polypectomie colique Splénectomie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Chlamydia, infection	À noter	Vérifier lors de l'anamnèse si présence d'autres maladies sexuellement transmissibles et si relation sexuelle stable.
	Traitement	CIT de 2 semaines après la fin du traitement et rétablissement complet.
	Voir aussi	Situations à risque
Cholécystectomie	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Lithiase vésiculaire
Cholécystite	Traitement	CIT de 2 semaines après arrêt du traitement antibiotique et disparition des symptômes.
	Voir aussi	Cholécystectomie Lithiase vésiculaire
Choléra	Traitement	CIT de 3 mois après guérison.
Choléra, contact	Traitement	CIT d'1 semaine après le retour d'une zone d'endémie.
Chorée de Huntington	Traitement	CID.
Chute de cheveux	Traitement	CIT de 4 semaines après l'arrêt du traitement avec Alo-capil®, Finacapil®, Finasterid® ou Propecia®.
Cirrhose	Traitement	CID.
Cirrhose hépatique	Se référer à	Cirrhose
Claudication intermittente	Traitement	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Coagulation, anomalies de la	Définition	Maladies hémorragiques et thrombophilie
	Traitement	<p>Accepter si statut de "porteur de trait hémophilique" en l'absence de symptomatologie (sans autres motifs d'exclusion).</p> <p>Accepter en l'absence de traitement, d'épisodes de thrombose ou d'autres symptômes même si résistance à l'APC/facteur V Leiden, anomalie du taux de facteur II, des protéines C et S, de l'antithrombine III, de l'homocystéine/présence d'anticorps antiphospholipides établies en laboratoire.</p> <p>En cas de doute, en référer au médecin du SRTS.</p>
	Voir aussi	<p>Anticoagulant, traitement</p> <p>Embolie pulmonaire</p> <p>Hémophilie A et B</p> <p>Purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI)</p> <p>Thrombose, artérielle</p> <p>Thrombose, veineuse profonde</p> <p>Thrombose, veineuse superficielle</p> <p>Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)</p>
Cocaïne	Se référer à	Drogue, usage de
Coeliaquie	Traitement	Accepter si traitement exclusivement diététique et formule sanguine en ordre.
Col utérin (carcinome in situ)	Se référer à	Cancer
Col utérin (Dysplasie)	Se référer à	Cancer
Colite	Se référer à	Diarrhée
Côlon irritable	Traitement	CIT si symptomatique.
Colostomie	Traitement	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Commotion cérébrale	Se référer à	Traumatisme cranio-cérébral (TCC)
Conisation du col utérin	Traitement	Accepter si aucun autre traitement n'est prévu.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Col utérin (carcinome in situ)
Conjonctivite	Définition	Inflammation de la conjonctive, souvent d'origine allergique (rhume des foins) ou infectieuse.
	Traitement	Se référer à: <ul style="list-style-type: none"> • Conjonctivite infectieuse • Conjonctivite allergique
Conjonctivite allergique	Définition	Inflammation de la conjonctive dans le cadre du "rhume des foins".
	Traitement	Se référer à Maladies allergiques
Conjonctivite infectieuse	Définition	Inflammation de la conjonctive dans le cadre d'une infection.
	Traitement	CIT de 2 semaines
Connaissance, perte de -	Traitement	CID si perte de connaissance lors de 2 dons consécutifs. En cas de doute, en référer au médecin du SRTS.
Contact avec du sang étranger	Définition	Blessure par piqûre d'aiguille ou contact d'une lésion cutanée ou cutanéomuqueuse avec le sang d'une personne inconnue.
	Traitement	CIT de 4 mois après exposition.
	Voir aussi	Blessure Personnel hospitalier
Coqueluche	Traitement	CIT d'1 mois après rétablissement complet.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Cornée, transplantation (Kératoplastie)	Traitement	CID.
Covid-19	Traitement	<p>CIT de 2 semaines après rétablissement complet. La persistance d'une agueusie ou anosmie (perte du goût ou de l'odorat) et/ou d'une toux sèche au-delà de 14 jours n'empêche pas l'admission de la donneuse ou du donneur.</p> <p>CIT de 2 semaines (à compter du jour du test) si test du Covid positif mais forme asymptomatique.</p>
	Voir aussi	Grippe, contact Refroidissement
Creutzfeldt-Jakob, maladie de (MCJ/CJD)	Définition	Une forme d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Elle entraîne une dégénérescence du SNC et une démence rapidement progressive en raison de protéines mal repliées (prions).
	Traitement	<p>CID</p> <ul style="list-style-type: none"> • en cas de greffe de méninges (dure-mère) ou de cornée (kératoplastie) • en cas de traitement par des hormones hypophysaires d'origine humaine • en cas de risque familial de maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'une autre encéphalopathie spongiforme transmissible • en cas d'antécédents familiaux de MCJ, on présume l'existence d'un risque familial, sauf s'il est établi que : <ol style="list-style-type: none"> 1. le membre de la famille concerné était atteint de la forme variante de la MCJ, et non de la fMCJ; ou 2. le membre de la famille concerné n'avait aucun lien génétique avec le donneur; ou 3. la cause de la MCJ chez le membre de la famille concerné était iatrogène; ou 4. le donneur a été testé et présente un polymorphisme génétique normal connu pour la PrPc.
	Voir aussi	Chirurgie neurologique Cornée, transplantation (Kératoplastie) Croissance, retard de

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Crohn, maladie de	Traitement	CID.
Croissance, retard de	Traitement	CID si traitement par des hormones extraites d'hypophyse humaine.
Curetage	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention si pathologie bénigne.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités) Interruption de grossesse
Cushing, maladie	Traitement	CID.
Cystite	Traitement	CIT jusqu'à guérison complète et 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie.
Décollement de la rétine (ablatio retinae)	Définition	Décollement de la rétine dû à différentes causes : les causes fréquentes sont le diabète, l'hypertonie, la myopie et les traumatismes.
	À noter	Se renseigner sur la maladie de base.
	Traitement	CIT d'1 mois après la fin de la thérapie, y compris le traitement au laser.
Dégénérescence maculaire (DMLA)	Définition	Modification de la cellule du nerf optique dans la macula.
	À noter	Ce sont des patients qui reçoivent une "piqûre dans l'œil".
	Traitement	CID
Dengue	Traitement	CIT d'1 mois après le retour d'une zone à risque. CIT de 4 mois après guérison (si forme non hémorragique). Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Dentaire, extraction	Traitement	<p>CIT d'1 semaine après extraction dentaire.</p> <p>CIT de 2 semaines après arrêt du traitement antibiotique et après disparition de la symptomatologie après extraction compliquée.</p>
Dentaire, traitement	Traitement	<p>CIT pendant 24 heures si détartrage.</p> <p>CIT de 2 semaines après la fin du traitement antibiotique si intervention compliquée.</p>
	Voir aussi	<p>Abcès</p> <p>Implants</p>
Dépression	Traitement	<p>Accepter si seulement prise de comprimés et situation médicale stable.</p> <p>CIT d'1 semaine après la dernière prise du médicament Lithium (propriétés tératogènes).</p>
Dermatite	Traitement	Accepter si la lésion est peu étendue, si traitement local (topique) et si le site de ponction est en zone saine.
Désaccoutumance à l'alcool (sevrage en cours)	Traitement	CIT jusqu'au terme du traitement.
Désaccoutumance à la nicotine	Traitement	Accepter
Désensibilisation, injections de	Définition	En cas de rhume des foins, d'allergies aux piqûres d'abeilles, de guêpes
	Traitement	CIT pendant 48 heures après la dernière injection.
	Voir aussi	Maladies allergiques
Diabète insipide	Traitement	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Diabète sucré	Traitement	<p>Accepter si sous traitement diététique avec ou sans antidiabétiques oraux, bien contrôlé et sans lésions organiques.</p> <p>Accepter en cas de traitement parentéral (sauf insulinothérapie) si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • absence de signes d'infection et d'autres anomalies de la peau aux sites d'injection, • les critères ci-dessus sont remplis, • détermination de l'aptitude par le médecin du SRTS, lors du premier don. <p>CIT si diabète instable ou atteinte organique.</p> <p>CID si diabète insulino-dépendant.</p>
Diarrhée	À noter	Faire préciser la fréquence et la durée des épisodes diarrhéiques (manifestation isolée, chronique, etc.).
	Traitement	CIT de 2 semaines après rétablissement complet et arrêt du traitement médical (exception: inflammation intestinale chronique).
	Voir aussi	Côlon irritable Crohn, maladie de Fièvre typhoïde Gastro-entérite, contact Rectocolite ulcéro-hémorragique Shigellose
Diphthérie	Traitement	CIT d'1 mois après guérison.
Diverticulite	Traitement	CIT de 3 mois après l'arrêt du traitement.
Diverticulose	Traitement	CIT si symptomatique.
Drépanocytose	Se référer à	Anémie falciforme

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Drogue, usage de	À noter	Une consommation de drogue par voie non parentérale retrouvée par anamnèse n'entraîne pas obligatoirement une CI. Il faut cependant analyser la fiabilité des réponses données, connaissant l'incidence particulièrement élevée des infections VIH, VHB, VHC dans la population concernée.
	Traitement	CIT de tout donneur sous l'emprise d'une drogue quelles que soient les modalités d'administration. CID si consommation par voie intraveineuse.
	Voir aussi	Rapports sexuels sous l'influence de drogues de synthèse; Chem-Sex Rapports sexuels, partenaires intimes Situations à risque
Dry Needling	Se référer à	Acupuncture
Duodenal, ulcère	Traitement	CIT si maladie symptomatique et traitement médical récent (administré au cours des 3 derniers mois).
	Voir aussi	Gastrectomie
Dure-Mère, Opération/Transplantation	Se référer à	Chirurgie neurologique
Dystrophie musculaire	Traitement	CID.
Ebola	Se référer à	Fièvre hémorragique à virus
Echinococcose	Traitement	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Eczéma	Définition	Appellation courante de la dermatite atopique. Inflammation chronique de la couche superficielle de la peau, accompagnée de démangeaisons. Elle se déclare souvent chez des personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de rhume des foins ou d'asthme.
	Traitement	<p>Accepter si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la zone concernée est circonscrite et • le site de ponction n'est pas touché et • aucun traitement n'est requis, ou tout au plus un traitement local (topique). <p>CIT si plaie ouverte, jusqu'à cicatrisation.</p> <p>CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement.</p>
Embolie pulmonaire	Traitement	<p>Accepter après rétablissement complet, si embolie graisseuse post-traumatique.</p> <p>CIT de 12 mois après la fin du traitement anticoagulant si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cause de la thrombose initiale à l'origine de l'embolie est mécanique (p. ex. immobilisation). • ou s'il agit d'un seul épisode de thrombose sans récurrence après 12 mois. <p>CIT dans tous les autres cas.</p>
	Voir aussi	Thrombose, veineuse profonde
Emphysème	Traitement	CID.
Encéphalite	Traitement	CIT jusqu'à guérison complète.
	Voir aussi	Encéphalite à tiques
Encéphalite à tiques	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet (asymptomatique durant 6 mois après la fin du traitement).
Endométriose	Traitement	<p>CIT si symptomatique.</p> <p>CIT de 2 mois après la dernière prise de médicaments contenant de l'acétate de leuproréline (téatogène).</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Endoscopie	Traitement	CIT de 4 mois après une endoscopie avec des instruments flexibles.
Epilation électrique	Se référer à	Acupuncture
Epilepsie	À noter	Une crise peut être déclenchée par un stress mineur. Il est donc important d'éviter tout risque inutile.
	Traitement	CIT si traitement anti-comitial au long cours. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS après évaluation individuelle, en l'absence de réapparition de crises plus de 3 ans après l'arrêt du traitement.
Epistaxis	Traitement	CIT si importante et répétitive et associée à une anémie.
Erysipèle	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
Erythème infectieux / "cinquième maladie"	Définition	Maladie infectieuse contagieuse provoquée par un parvo-virus, souvent asymptomatique. Seul une partie des personnes infectées présente l'éruption cutanée caractéristique.
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact
Etudes cliniques	Traitement	CIT des donneurs participant à des études cliniques, prenant des médicaments non encore enregistrés ou se prêtant à des injections. Cette recommandation s'applique également aux personnes participant à des études de phase 1 (étude de toxicité avant l'introduction d'un nouveau médicament). En cas de doute, en référer au médecin du SRTS.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Facteur V de Leiden mutation	Voir aussi	Coagulation, anomalies de la Embolie pulmonaire Thrombose, artérielle Thrombose, veineuse profonde Thrombose, veineuse superficielle
Facteurs de coagulation, administration	Voir aussi	Hémophilie A et B Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)
Fausse couche	Se référer à	Interruption de grossesse
Fibrillation auriculaire	Se référer à	Troubles du rythme cardiaque
Fibroadénome du sein, ablation	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités)
Fibromyalgie	Se référer à	Maladies auto-immunes
Fièvre	Définition	Température > 38°C
	À noter	Essayer de déterminer la cause. S'enquérir des voyages effectués à l'étranger en particulier dans des régions tropicales.
	Traitement	CIT de 2 semaines après disparition des symptômes.
Fièvre hémorragique à virus	Traitement	CIT de 12 mois après guérison si Lassa, Marburg, Congo/Crimée. CID après infection à Ebola.
	Voir aussi	Dengue

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Fièvre hémorragique à virus, contact	Traitement	CIT d'1 mois après le retour.
Fièvre jaune	Traitement	CIT de 3 mois après rétablissement complet.
Fièvre jaune, contact	Traitement	CIT d'1 mois après le contact.
Fièvre paratyphoïde	Se référer à	Fièvre typhoïde
Fièvre Q	Traitement	CIT de 2 ans après rétablissement.
Fièvre récurrente	Traitement	CIT de 2 ans après guérison complète.
Fièvre typhoïde	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines au moins après arrêt de l'antibiothérapie.
Filariose	Traitement	CID.
Fracture simple	Traitement	<p>CIT jusqu'au rétablissement complet.</p> <p>CIT d'1 mois après retrait du plâtre.</p> <p>CIT d'1 mois après arrêt de l'anticoagulation (si sous-cutanée ou orale, sauf si tératogène) et/ou retrait du plâtre.</p> <p>CIT de 3 mois après la dernière prise d'anticoagulants oraux inconnus ou tératogènes.</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS en cas de fracture spontanée.</p>
	Voir aussi	<p>Anticoagulant, traitement</p> <p>Implants</p> <p>Ostéoporose</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Fracture, ostéosynthèse	Traitement	CIT d'1 mois après ablation du matériel d'ostéosynthèse. CIT de 3 mois après ostéosynthèse.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Implants Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)
Furoncle	Se référer à	Abcès
G6PD, déficit en -	Traitement	CID.
Gastrectomie	Définition	avec/sans duodénectomie
	Traitement	CIT de 6 mois après gastrectomie partielle. CIT de 12 mois après traitement chirurgical d'un ulcère peptique.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Chirurgie viscérale
Gastrique, ulcère	Traitement	CIT de 3 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Endoscopie Gastrectomie
Gastrite	Traitement	Accepter si symptomatologie mineure soulagée par la prise régulière ou épisodique d'antiacides ou d'inhibiteurs de la pompe à protons. CIT si antiacides ou inhibiteurs de la pompe à protons inefficaces. CIT d'1 mois après disparition des symptômes, si maladie en poussée aiguë.
Gastro-entérite	Se référer à	Diarrhée

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Gastro-entérite, contact	Traitement	CIT d'1 semaine après le contact.
Gilbert, maladie de	Traitement	CIT si ictère.
	Voir aussi	Ictère
Glaucome	Définition	Lésion du nerf optique due à une augmentation de la pression dans l'œil.
	Traitement	Accepter si traitement local (gouttes ophtalmiques) ou si traitement par bêtabloquant, après contrôle du pouls (> 60/min) et de la pression artérielle (> 120/60 mm Hg). CIT jusqu'à l'arrêt de tous les autres traitements.
	Voir aussi	Glaucome, opération
Glaucome, opération	Traitement	CIT d'1 mois après rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Chirurgie ophtalmologique
Glomérulonéphrite	Traitement	CIT de 12 mois après guérison complète.
Goître	Se référer à	Hyperthyroïdie
Gonorrhée	Traitement	CIT de 12 mois après la fin du traitement du patient et de son partenaire sexuel régulier.
Goutte	Traitement	Accepter si forme mineure, éventuellement traitée par Allopurinol. CIT de 2 semaines après disparition des symptômes d'une poussée aiguë.
Grippe	Traitement	CIT de 2 semaines après guérison.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Grippe, contact	Traitement	CIT de 2 semaines après contact avec un malade.
Grossesse	Traitement	CIT durant toute la durée de la grossesse et 12 mois après l'accouchement.
	Voir aussi	Interruption de grossesse
Grossesse, désir de	Traitement	Accepter CIT de 6 mois après la dernière prise de Clomid®/clomifène (propriétés tératogènes).
Guillain-Barré, syndrome de	Traitement	CIT de 2 ans après rétablissement complet sans séquelles en 12 mois et absence de récurrence (confirmation du diagnostic par le médecin traitant).
Handicap mental	Traitement	CIT si le donneur n'est pas en mesure de comprendre les critères d'aptitude au don.
Handicap physique	Traitement	CIT en fonction du type de handicap : le donneur ne peut pas s'allonger sur un lit et/ou les conditions visant à assurer sa sécurité ne sont pas réunies.
Haschich	Se référer à	Cannabis
Hémochromatose	Traitement	Accepter les donneurs porteurs du gène de l'hémochromatose, en l'absence de surcharge martiale.
		Accepter en cas de prédisposition génétique avec diagnostic d'hémochromatose sans participation d'organes significative (exception faite de l'arthropathie). Statut après traitement par saignées possible. Absence d'élévation de la ferritine. Fréquence des prélèvements: jusqu'à 6 fois par an pour les hommes et 4 fois par an pour les femmes. L'intervalle de 10 semaines entre les dons peut être raccourci.
		CIT si lésions viscérales (excepté l'arthropathie).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hémoglobine	Traitement	<p>Accepter des valeurs inférieures possible au cas par cas d'entente avec le médecin du SRTS.</p> <p>Accepter pour don du sang total, si</p> <ul style="list-style-type: none"> femmes ≥ 125 g/l hommes ≥ 135 g/l. <p>Accepter donneurs d'aphérèse, si</p> <ul style="list-style-type: none"> femmes ≥ 110 g/l hommes ≥ 120 g/l <p>CIT, si</p> <ul style="list-style-type: none"> femmes > 190 g/l hommes > 200 g/l.
Hémoglobinopathies	Définition	Affections résultant d'un défaut de la synthèse de l'hémoglobine généralement dû à une anomalie génétique. La significativité clinique dépend de l'hérédité, de la forme (hétéro ou homozygote) et de la localisation de la mutation génétique.
	Voir aussi	Anémie falciforme Thalassémie
Hémopathies malignes	Se référer à	Cancer
Hémophilie A et B	Traitement	Accepter si statut de "porteur du trait hémophilique" (sans autre facteur de risque). CID dans tous les autres cas.
	Voir aussi	Coagulation, anomalies de la Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)
Hémorroïdes	Traitement	CIT si saignements réguliers ou importants.
Hémorroïdes, cure chirurgicale	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hépatite A	Traitement	CIT de 4 mois.
Hépatite B	Traitement	<p>CIT de 4 mois après avoir séjourné pendant 6 mois ou plus dans des pays où la prévalence du VHB est élevée.</p> <p>CIT en cas de recherche positive d'Ag HBs et/ou de NAT/PCR VHB et/ou d'anti-HBc, cf. Annexe Art. 8.1 «Algorithme d'aide au diagnostic virologique par le VHB / VHC / VIH».</p> <p>Les critères énoncés au Annexe Art. 7.3 („Vaccine Check - Check vaccinations“) doivent être remplis.</p>
	Voir aussi	<p>Hépatite B, partenaire sexuel</p> <p>Hépatite B, vie en ménage commun</p> <p>Hépatite, activités à risque, contact</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p>
Hépatite B, partenaire sexuel	Traitement	<p>CIT de 6 mois si le donneur avait un partenaire sexuel présentant une infection avérée par le VHB, après arrêt des rapports sexuels, prélèvement additionnel d'un échantillon à des fins diagnostiques (anti-HBc).</p> <p>CIT du donneur si poursuite des rapport sexuels.</p>
	Voir aussi	<p>Hépatite, activités à risque, contact</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p>
Hépatite B, vie en ménage commun	Définition	Compagnon de vie
	Traitement	<p>CIT du donneur si poursuite de la vie en ménage commun.</p> <p>CIT de 6 mois après arrêt des contacts avec son compagnon de vie qui avait une infection VHB confirmée, prélèvement additionnel d'un échantillon à des fins diagnostiques (anti-HBc).</p>
	Voir aussi	<p>Hépatite, activités à risque, contact</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hépatite C	Traitement	CIT de 4 mois après avoir séjourné pendant 6 mois ou plus dans des pays où le taux de VHC est élevé. CID si Ac anti-VHC et/ou PCR VHC positifs.
	Voir aussi	Hépatite, activités à risque, contact Rapports sexuels, partenaires intimes
Hépatite C, partenaire sexuel	Traitement	CIT de 6 mois si le donneur avait un partenaire sexuel présentant une infection confirmée par le VHC, après arrêt des rapports sexuels, CID du donneur si poursuite des rapport sexuels.
	Voir aussi	Rapports sexuels, partenaires intimes
Hépatite E	Traitement	CIT de 3 mois
Hépatite infectieuse sans preuve objective	Traitement	CID et informer le donneur sans marqueur d'hépatite dépistable si, à la suite de ses dons de sang, forte suspicion d'hépatite post-transfusionnelle chez deux receveurs. Eventuellement rappel du plasma et/ou look back.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hépatite, activités à risque, contact	Traitement	<p>Accepter le personnel hospitalier en charge de patients présentant une hépatite ou personnel de laboratoire dès lors qu'un accident d'exposition au sang peut être exclu.</p> <p>CIT de 4 mois après :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tatouage; • maquillage semi-permanent; • endoscopie avec instruments flexibles; • un contact avec du sang étranger (bles-sure par piqûre d'aiguille ou contact d'une lésion cutané-muqueuse avec le sang d'une personne inconnue); <p>CIT de 6 mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> • après le dernier contact étroit avec une personne souffrant de VHB vivant dans le même ménage. <p>CIT de 12 mois de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • toute personne ayant reçu des immunoglobulines anti-hépatite B après accident d'exposition au sang.
	Voir aussi	<p>Acupuncture</p> <p>Contact avec du sang étranger</p> <p>Endoscopie</p> <p>Hépatite B, partenaire sexuel</p> <p>Hépatite B, vie en ménage commun</p> <p>Hépatite C, partenaire sexuel</p> <p>Personnel hospitalier</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p> <p>Tatouage/ Tattoo</p>
Hépatite, anamnèse imprécise	À noter	<p>En cas d'anamnèse imprécise pour l'hépatite, uniquement prélèvement d'un échantillon à des fins diagnostiques.</p>
	Voir aussi	<p>Hépatite B</p> <p>Hépatite C</p>
Hernie discale	Traitement	Accepter en l'absence d'intervention chirurgicale.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hernie discale, Opération	Traitement	<p>CIT de 6 à 12 mois (selon évaluation par le médecin du SRTS) après l'intervention pour élargissement du canal médullaire/spondylodèse.</p> <p>CIT de 3 mois après intervention peu invasive (hémilaminectomie).</p>
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Hernie hiatale, Opération	Traitement	CIT de 6 mois après l'intervention, en l'absence de complications.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Hernie inguinale, Opération	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Héroïne	Se référer à	Drogue, usage de
Herpès génital	Traitement	<p>CIT jusqu'à guérison des lésions et 2 semaines après arrêt du traitement, si l'anamnèse ne révèle aucune autre maladie sexuellement transmissible (p. ex. chlamydia).</p> <p>CIT de 2 semaines après le dernier rapport sexuel ou guérison des lésions du partenaire régulier.</p>
Herpès labial	Définition	«Boutons de fièvre». Apparition de vésicules sur les lèvres, manifestation la plus fréquente d'une infection par le virus herpès simplex.
	Traitement	CIT jusqu'à guérison des lésions.
Herpes zoster	Se référer à	Zona
Hormonal, traitement	Traitement	<p>Accepter si traitement de la ménopause ou à titre préventif d'une ostéoporose.</p> <p>CID après traitement par gonadotrophines (utilisées dans le cadre de la stérilité) d'origine humaine.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


HTLV I/II	Définition	Virus T-lymphotrophique humain I/II
	Traitement	CID.
Hypercholestérolémie	Traitement	Accepter même en cas de traitement. Accepter en l'absence d'atteinte cardiaque ou vasculaire ou d'autre affection symptomatique concomitante.
	Voir aussi	Maladies cardio-vasculaires
Hypertension artérielle	Traitement	CIT si traitement par bêtabloquant et pouls fixé < 60/min et/ou TA systolique < 120 mm Hg CIT si la TA systolique > 180 mm Hg ou la diastolique > 100 mm Hg. CIT si début de traitement par antihypertenseurs ou changement de traitement jusqu'à ce que la TA soit sous contrôle.
	Voir aussi	Bradycardie
Hypertension artérielle pulmonaire	Traitement	CID.
Hyperthyroïdie	Traitement	CIT de 6 mois après thyroïdectomie ou traitement par iode radioactif. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si traitement par antithyroïdiens de synthèse (p. ex. Néo-mercazole).
	Voir aussi	Thyroïdite auto-immune
Hypotension artérielle	À noter	Effortil® ne peut être administré avant le don.
	Traitement	CIT si pression systolique < 100 mm Hg et pression diastolique < 50 mm Hg. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si pression systolique < 120 mm Hg chez un hypertendu traité et/ou vertige d'origine indéterminée.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Hypothyroïdie	À noter	Rechercher des complications éventuelles (p. ex. angor).
	Traitement	Accepter si stabilisé par traitement de substitution et asymptomatique.
	Voir aussi	Thyroïdite auto-immune
Hystérectomie	Traitement	CIT d'1 mois à 3 mois si pathologie bénigne, en fonction de la nature de l'intervention et des complications éventuelles, après évaluation par le médecin du SRTS.
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités)
Ictère	Traitement	Accepter si antécédent d'hémolyse néonatale, lithiase vésiculaire, ictère congénital non infectieux (maladie de Gilbert) ou autre cause documentée et non infectieuse (toxique, médicamenteuse).
	Voir aussi	Gilbert, maladie de Hépatite, anamnèse imprécise Lithiase vésiculaire
Iléostomie	Traitement	CID.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Immunobiothérapie	Traitement	Accepter pour les préparations bactériennes (p. ex. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccaline®, Luivac®, Ribomunyl®) en l'absence de pathologie sous-jacente chronique ou d'infection récidivante. CIT de 12 mois après arrêt de l'immunothérapie à partir de tissus d'origine humaine (p. ex. Cytotect®, Hepatect®, vaccin passif contre la rage et le tétanos, Varitect®). Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si immunothérapie d'origine humaine/bovine (p. ex. Solcoceryl®).
	Traitement	CIT pendant 72 heures (en l'absence de signes d'inflammation cutanée).
	Traitement	
Implanon®	Traitement	CIT pendant 72 heures (en l'absence de signes d'inflammation cutanée).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Implants	Traitement	<p>Accepter des implants posés en Suisse après 1993.</p> <p>Accepter des implants posés hors de Suisse, à condition qu'aucun tissu ou cellule d'origine humaine ou animale, ni aucun dérivé de ceux-ci, n'ait été utilisé lors de leur fabrication.</p> <p>CID des implants s'ils ont été posés en Suisse avant 1993.</p> <p>CID pour les implants posés hors de Suisse, si des tissus ou des cellules d'origine humaine ou animale ou leurs dérivés ont été utilisés lors de leur fabrication.</p>
	Voir aussi	<p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p> <p>Dentaire, traitement</p>
Infarctus du myocarde	Traitement	CID.
Inflammation de la cornée	Se référer à	Kératite (inflammation de la cornée)
Inflammation du foie, infectieux	Se référer à	Hépatite, anamnèse imprécise
Influenza	Se référer à	Grippe
Insuffisance cardiaque	Définition	Défaillance du cœur entraînant une dégradation de l'apport d'oxygène dans l'organisme.
	Traitement	CID.
Insuffisance rénale chronique	Traitement	CID.
Insuffisance surrénale	Traitement	CID même en cas de substitution.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Interruption de grossesse	Traitement	<p>CIT d'une durée équivalente au stade de la grossesse à la date de l'interruption (grossesse de moins de 28 semaines).</p> <p>CIT de 12 mois en cas d'interruption au cours du 3ème trimestre (> 28 semaines).</p>
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Intoxication alimentaire	Se référer à	Diarrhée
Jaunisse	Se référer à	Ictère
Kala-Azar	Traitement	CID.
Kératite (inflammation de la cornée)	Définition	Inflammation de la cornée, souvent infectieuse.
	Traitement	CIT de 2 semaines après guérison complète et fin du traitement.
Kyste(s) ovarien(s)	Définition	Tumeur(s) bénigne(s) remplie(s) de liquide au niveau de l'ovaire, souvent sans cause pathologique.
	Traitement	<p>Accepter</p> <p>En cas d'affection maligne, même traitement que pour le critère "cancer".</p>
Kyste(s) rénal(aux)	Définition	Cavité(s) remplie(s) de liquide dans ou sur le rein.
	Traitement	<p>Accepter si fonction rénale normale.</p> <p>En cas d'affection maligne, même conduite à tenir que pour le critère "cancer".</p>
Lambliaze	Traitement	<p>CIT pendant 24 heures au moins après guérison et arrêt de tout médicament distribué sans ordonnance.</p> <p>CIT de 2 semaines après la dernière prise d'antibiotiques.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Laminectomie	Traitement Voir aussi	CIT pendant au moins 6 mois. Chirurgicale, intervention (Généralités) Hernie discale, Opération
Laryngite	Se référer à	Amygdalite
Légionellose	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
Leishmaniose	Se référer à	Kala-Azar
Leptospirose	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
les traitements au laser : Laser pour le décollement de la rétine, laser pour la cornée	Se référer à	Chirurgie ophtalmologique
Lichen plan	Se référer à	Eczéma
Ligament, rupture du	Traitement Voir aussi	Accepter sauf si l'opération remonte à moins d'un mois. En cas de doute, en référer au médecin du SRTS. Chirurgicale, intervention (Généralités) Chirurgie orthopédique
Ligature des trompes	Se référer à	Stérilisation tubaire
Lithiase rénale	Traitement	CIT si symptomatique et signes d'infection (fièvre, douleur).


 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Lithiase rénale, opération	Traitement	CIT d'1 mois si lithotrypsie. CIT de 6 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Lithiase vésiculaire	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si symptomatique.
	Voir aussi	Cholécystite
Lupus érythémateux systémique	Traitement	CID.
Luxation articulaire	Traitement	CIT d'1 semaine au moins après l'accident.
Lyme, maladie de	Traitement	Accepter si présence avérée d'anticorps sans symptôme. CIT de 2 semaines après l'arrêt du traitement et guérison complète. CID si infection chronique.
Lymphangite	Traitement	CID si affection maligne.
	Voir aussi	Erysipèle
Lymphogranulome vénérien	Traitement	CIT jusqu'à réussite du traitement documentée par le médecin.
Maladie coeliaque	Se référer à	Coeliaque
Maladie de Horton	Se référer à	Artérite temporale
Maladie du sommeil	Se référer à	Trypanosomiase africaine


 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Maladie vasculaire cérébrale	Traitement	CID si AVC/apoplexie/attaque cérébrale, statut après stent/laser, sténoses artérielles, anévrisme, séquelles d'une ischémie cérébrale, en particulier en cas de symptômes paralytiques: hémiplégie (AVC), accident ischémique transitoire (AIT)
	Voir aussi	Surdité brutale neurologique

Maladie, Yeux	Traitement	CIT de 2 semaines en cas d'inflammation. CIT d'1 mois en cas d'opération(s).
	Voir aussi	Cataracte Chalazion (hordéole interne) Conjonctivite allergique Conjonctivite infectieuse Détachement de la rétine (ablatio retinae) Dégénérescence maculaire (DMLA) Glaucome Kératite (inflammation de la cornée) Orgelet Rétinite pigmentaire Thrombose de l'artère ophtalmique Thrombose oculaire Uveïtis


 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Maladies allergiques	Définition	<p>Réaction d'hypersensibilité, c.-à-d. réponse inadaptée du système immunitaire à une substance habituellement inoffensive.</p> <p>Degré de gravité et nature des symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grade 1: prurit, érythème, urticaire, angioedème • Grade 2: grade 1, rhinorrhée (écoulement nasal), enrouement, dyspnée, nausées, vomissement, tachycardie, hypotension, troubles du rythme cardiaque • Grade 3: grade 1, vomissement, œdème des voies respiratoires supérieures, bronchospasme, choc • Grade 4: grade 1, vomissement, arrêt respiratoire, arrêt cardiaque
	Traitement	<p>Accepter si actuellement aucun symptôme ou seulement des symptômes légers (grade 1) avec ou sans traitement (local, antihistaminique, en aérosol).</p> <p>CIT si symptômes de grade 2, jusqu'à régression des symptômes.</p> <p>CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement.</p> <p>CIT si traitement immunosuppresseur (p. ex. par anticorps monoclonal [anti-IgE]), jusqu'à 1 an après la fin du traitement.</p> <p>CIT si symptômes de grade 3 ou 4, jusqu'à 2 semaines après rétablissement complet.</p> <p>CIT si allergie de contact à du matériel utilisé pour le prélèvement sanguin (désinfectant pour les mains, gants, pansement adhésif) en l'absence de produit de remplacement sur place.</p>
Maladies auto-immunes	Traitement	CIT si atteinte multiviscérale, après évaluation par le médecin du SRTS et confirmation par le médecin traitant.
	Voir aussi	<p>Guillain-Barré, syndrome de</p> <p>Lupus érythémateux systémique</p> <p>Spondylarthrite ankylosante</p> <p>Thyroïdite auto-immune</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Maladies cardio-vasculaires	Traitement	<p>Accepter si maladie congénitale, (ex. Malformation bénigne opérée sans complication et sans antibiothérapie prophylactique).</p> <p>Accepter si prolapsus mitral.</p> <p>CID si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maladie coronarienne • angor/angine de poitrine • infarctus du myocarde • arythmie cardiaque importante d'origine organique • fibrillation auriculaire • mise en place d'un pacemaker • intervention cardiaque (bypass) • patients sous antibiothérapie prophylactique • statut après Stent/Laser • sténoses artérielles • claudication intermittente/artériopathie périphérique oblitérante • anévrisme • sténose de la valve mitrale (maladie cardiaque rhumatismale) • hypertension artérielle pulmonaire • insuffisance cardiaque.
	Voir aussi	Transplantation

Maladies cutanées	Traitement	<p>Accepter si expression cutanée d'une maladie constitutionnelle (neurodermatose, psoriasis, eczéma, etc.), en l'absence de lésion du pli du coude et de traitement potentiellement tératogène.</p> <p>CIT dépendant de la cause si généralisée.</p>
	Voir aussi	<p>Blessure</p> <p>Eczéma</p> <p>Lyme, maladie de</p> <p>Psoriasis</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Maladies digestives	Traitement	CID si affection immunologique (p. ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse) ou susceptible d'entraîner une carence martiale (trouble de l'absorption du fer ou saignements).
	Voir aussi	Diarrhée

Maladies infectieuses, contact	Traitement	Accepter si vaccination ou immunisation antérieure (anamnèse). CIT d'1 mois après contact (ou si durée d'incubation inconnue). Se référer au critère spécifique.
	Voir aussi	Contact avec du sang étranger


Maladies respiratoires	Traitement	Accepter si affection pulmonaire chronique (BPCO) non décompensée (absence de surinfection, d'asthme, de polyglobulie). CID si affection grave et/ou atteinte chronique nécessitant une corticothérapie au long cours. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si affection aiguë.
-------------------------------	------------	---

Maladies, psychiatriques	Voir aussi	Dépression Psychose, aiguë Psychose, non aiguë Schizophrénie Trouble bipolaire Trouble panique
---------------------------------	------------	---


Mantoux, test	Traitement	CIT jusqu'à la fin des investigations mais au moins 1 semaine après l'injection de la tuberculine.
	Voir aussi	Tuberculose

Maquillage semi-permanent	Se référer à	Tatouage/ Tattoo
----------------------------------	--------------	------------------


Marfan, syndrome de	Traitement	CID
----------------------------	------------	-----

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Mastocytose	Définition	Affection rare caractérisées par l'accumulation anormale de mastocytes dans divers organes (principalement dans la peau). Elle se distingue des réactions allergiques typiques par son caractère chronique plutôt qu'épisodique.
	Traitement	CID.
Mastoïde, opération de la	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Mastoïdite	Traitement	CIT de 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie.
Médecine alternative	Se référer à	Médecine naturelle
Médecine naturelle	À noter	Les traitements homéopathiques ou les médicaments d'origine naturelle ne sont pas des CI au don de sang. La CI éventuelle dépend des conditions d'administration (iv/sc, traitement sanguin par voie extra-corporelle), de l'origine des médicaments (humaine/animale), tout comme de la maladie sous-jacente.
	Traitement	Accepter si traitement homéopathique.
	Voir aussi	Acupuncture
Médicamenteux, traitement	Traitement	<p>Pour déterminer la conduite à tenir en cas de prise de médicaments, cf Annexe Art. 7.1. Le chapitre comprend une liste des médicaments d'usage fréquent.</p> <p>Le Annexe Art. 7.1 ne mentionne un délai de contre-indication précis que lorsque le médicament lui-même en exige un, notamment en cas de tératogénicité ou d'effets sur la qualité des produits sanguins (antiagrégants plaquettaires p. ex.).</p> <p>Dans tous les autres cas, l'aptitude au don du sang dépend de la pathologie sous-jacente.</p> <p>En cas de doute, se référer au médecin du SRTS.</p>
	Voir aussi	Médecine naturelle

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Médicaments	Se référer à	Médicamenteux, traitement
Ménière, maladie de	Se référer à	Vertiges
Méningite	À noter	Absence d'antécédent de crise comitiale.
	Traitement	CIT de 3 mois après rétablissement complet.
Méningo-encéphalite	Se référer à	Encéphalite à tiques
Ménisque, Opération	Se référer à	Chirurgie orthopédique
Menstruation	Traitement	Accepter même pendant les règles, si taux d'hémoglobine normal. CIT en cas de retard de règles pouvant faire évoquer le début d'une grossesse.
Microblading/ Mikro-blading	Traitement	CIT de 4 mois
Migraine	Traitement	Accepter en l'absence de crise au moment du don. CIT d'1 mois après la dernière prise de médicaments contenant du topiramate (tératogène).
Minkowski-Chauffard, maladie	Se référer à	Sphérocytose héréditaire
Mononucléose infectieuse	Traitement	CIT de 6 mois après rétablissement complet.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Morsure, animal sauvage ou domestique	Traitement	<p>CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie.</p> <p>La rage a été éradiquée en Suisse et dans les pays limitrophes. Risque potentiel à envisager en zone endémique.</p> <p>En cas de doute, CIT de 12 mois.</p>
	Voir aussi	Vaccination
Morsure, humaine	Traitement	CIT de 4 mois.
Muguet	Se référer à	Candidose
Mycose	Traitement	<p>Accepter si topique.</p> <p>CIT de 2 semaines après arrêt du traitement d'une mycose superficielle et après le rétablissement complet</p> <p>CIT si mycose profonde.</p>
Myomectomie	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	<p>Cancer</p> <p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p>
Myxoedème	Traitement	CIT si maladie non stabilisée par le traitement.
	Voir aussi	Hypothyroïdie
Nématodes	Traitement	CIT jusqu'à la fin du traitement.
	Voir aussi	<p>Bilharziose</p> <p>Echinococcose</p> <p>Filariose</p>
Néphrectomie	Se référer à	Chirurgicale, intervention (Généralités)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Néphrétique, colique	Traitement	CIT si symptomatique.
	Voir aussi	Lithiase rénale
Néphrite	Traitement	CIT de 5 ans au minimum après rétablissement complet de la fonction rénale à la suite d'une néphrite aiguë. CID si néphrite chronique.
	Voir aussi	Cancer
Neurofibromatose	Traitement	CID si dégénérescence maligne nécessitant un traitement.
	Voir aussi	Cancer
Neuroleptiques	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS
Obésité, traitement parentéral	Traitement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> • absence de troubles circulatoires, • absence de signes d'infection et d'autres anomalies de la peau aux sites d'injection, • injection par un professionnel spécialement formé.
	Voir aussi	Diabète sucré
Oesophagite	Se référer à	Gastrite
Opérations des paupières	Se référer à	Chirurgie ophtalmologique
Oreillons	Définition	Parotidite épidémique. Affection virale contagieuse qui touche les glandes salivaires mais aussi d'autres organes.
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Orgelet	Définition	Inflammation infectieuse et douloureuse du bord de la paupière, généralement d'origine bactérienne.
	Traitement	CIT de 2 semaines après la guérison complète et la fin du traitement
Ostéomyélite	Traitement	CIT de 2 ans après rétablissement complet et arrêt de l'antibiothérapie.
Ostéoporose	Traitement	Accepter CID en cas de fracture spontanée.
Otalgie / Otite	Traitement	CIT jusqu'à la guérison complète et pendant 2 semaines après la fin du traitement par antibiotiques.
Pacemaker	Traitement	CID.
Paludisme	Se référer à	Paludisme / Régions endémiques
Paludisme / Régions endémiques	À noter	<p>Les donneurs suivants ne pourront être réadmis que si un test de paludisme (IF ou ELISA) effectué au moins 4 mois après le retour s'avère négatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en cas de fièvre inexplicable ou d'autres symptômes de maladie durant ou après le séjour. • en cas d'anamnèse positive du paludisme. • lors d'un séjour de plus de 6 mois dans une région où le paludisme est endémique.
	Traitement	<p>CIT de 4 mois après le retour d'une région endémique si résultat négatif au test de paludisme (IF ou ELISA).</p> <p>CIT pour une période d'au moins 6 mois après le retour d'une région endémique en l'absence de test de paludisme.</p> <p>CIT de 3 ans si le test de laboratoire s'avère positif. Une fois ce délai écoulé, on pourra procéder à un nouveau test. CID si ce test se révèle à son tour positif. CID si le test de laboratoire n'est pas réalisé. Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Paludisme, prophylaxie	Traitement	Accepter si prise avant le voyage.
Pancréatite	Traitement	CIT de 3 mois après une crise, en l'absence de symptômes.
Paralysie faciale à frigore	Traitement	CIT d'1 mois à partir de la guérison complète en cas de cause infectieuse (herpès zoster (zona), autre bactérien ou viral) et/ou d'administration de corticoïdes au donneur.
Parkinson	Traitement	CID.
Partenaires intimes	Se référer à	Rapports sexuels, partenaires intimes
Peau, cancer de	Se référer à	Cancer
Pemphigus	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet. CID si pathologie auto-immune systémique.
Peptique, ulcère	Se référer à	Gastrique, ulcère
Péricardite virale	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
Péritonite	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie. En cas d'affection maligne, même traitement que pour le critère "cancer".
	Voir aussi	Cancer

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Personnel hospitalier	Traitement	CIT seulement après accident d'exposition au sang (quel que soit le domaine d'activité : personnel de laboratoire ou personnel de soin en charge de patients atteints d'hépatite/SIDA).
	Voir aussi	Contact avec du sang étranger
Petit mal	Se référer à	Epilepsie
Pharyngite	Se référer à	Amygdalite
Phlébite	Se référer à	Thrombose, veineuse superficielle
Piercing	Traitement	CIT de 4 mois.
Piqûre	Se référer à	Aiguilles
Plaie	Traitement	CIT si plaie complexe/ouverte. CIT de 2 semaines après ablation des points de suture et absence de signes d'infection.
Pleurésie	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie. CID si affection maligne.
Pleurite	Se référer à	Pleurésie
Pneumonie	Traitement	CIT pendant au moins 6 semaines et 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie. CID si affection maligne.
Pneumothorax	Traitement	CIT jusqu'à guérison complète de la lésion si pneumothorax traumatique ou spontané. CID si complication d'un emphysème.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Poids	Traitement	CID si poids < 50 kg.
Poliomyélite	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS
Polyarthrite	Se référer à	Arthrite
Polycythémie primitive	Traitement	CID.
Polypectomie colique	Traitement	CIT de 4 mois à compter de l'opération, en fonction de la nature de l'intervention et des complications éventuelles. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS sur la base des résultats histologiques.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Polypose colique	Traitement	CIT si symptomatique. CID si polypose familiale.
Polytraumatisme	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)
Proctite	Traitement	CIT si traitement en cours.
	Voir aussi	Crohn, maladie de Rectocolite ulcéro-hémorragique
Produit de contraste	À noter	Se renseigner sur le motif et le résultat de l'examen pour s'assurer que la maladie de base ne constitue pas une contre-indication.
	Traitement	CIT d'1 semaine après l'examen avec produit de contraste.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Prolapsus utérin, opération	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Prophylaxie post-exposition (PEP) et prophylaxie pré-exposition (PrEP)	Traitement	CIT de 4 mois après la fin du traitement PEP / PrEP.
Prostate, hyperplasie de la	Traitement	<p>CIT de 4 semaines après l'arrêt du traitement avec finastérides ou du Proscar®.</p> <p>CIT de 6 mois après l'arrêt du traitement avec dutastéride (Avodart®) ou dutastéride/tamsulosine (Duo-dart®). La prise de tamsulosine seule est autorisée (p. ex. Pradif®, Tamsulosin T-Mepha® retard).</p>
Prostatectomie	Traitement	<p>CIT d'1 mois après l'intervention si affection bénigne et jusqu'au rétablissement complet.</p> <p>En cas d'affection maligne sous-jacente, même traitement que pour le critère "cancer".</p>
	Voir aussi	<p>Cancer</p> <p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p>
Prostitution, Sexworker	Définition	Sexworker sont des personnes qui ont des contacts sexuels en échange d'argent, de drogues ou de médicaments.
	Traitement	<p>CIT de 12 mois pour les sexworker.</p> <p>CIT de 12 mois après un contact sexuel avec un sexworker. Cette période peut être réduite à 4 mois, à condition que le/la sexworker ait cessé complètement son activité depuis au moins 12 mois.</p> <p>CID pour les sexworker qui ont eu des contacts dans le cadre de l'acceptation de drogues pour l'injection.</p> <p>Se référer au "Formulaire d'information pour les donateurs de sang".</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Prothèse totale de hanche / de genou	Traitement	CIT de 6 à 12 mois après l'intervention (selon évaluation par le médecin du SRTS).
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Provenance de pays où le taux élevé de VIH, de VHB et de VHC	Traitement	<p>CIT de 4 mois après l'arrivée en Suisse.</p> <p>Se référer Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>
Psoriasis	Traitement	<p>Accepter si lésion peu importante, à distance du site de ponction, en l'absence de traitement systémique.</p> <p>CIT de 6 mois après l'arrêt du traitement avec du méthotrexate.</p> <p>CIT de 3 ans après l'arrêt du traitement avec de l'acitrétine (Neotigason®).</p> <p>CIT si forme sévère généralisée.</p>
Psychose, aiguë	Définition	La psychose désigne un groupe de troubles psychiques graves qui s'accompagnent d'une perte temporaire importante du contact avec la réalité.
	À noter	<p>Évaluation au moins une fois de la maladie de base par le médecin du SRTS.</p> <p>La polymédication et les hospitalisations doivent être prises en compte.</p>
	Traitement	<p>CIT jusqu'à la disparition des symptômes.</p> <p>En cas de doute sur le caractère aigu ou non de la maladie, l'aptitude au don doit être évaluée par le médecin du SRTS.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Psychose, non aiguë	Définition	La psychose désigne un groupe de troubles psychiques graves qui s'accompagnent d'une perte temporaire importante du contact avec la réalité.
	À noter	Évaluation au moins une fois de la maladie de base par le médecin du SRTS. La polymédication et les hospitalisations doivent être prises en compte.
	Traitement	Accepter si stable le jour du don. En cas de doute sur le caractère aigu ou non de la maladie, l'aptitude au don doit être évaluée par le médecin du SRTS.
Purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI)	Traitement	Accepter si rémission depuis 12 mois au moins, absence de médication et nombre de plaquettes normal. Accepter si anamnèse de PTI durant l'enfance. CID dans les autres cas.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)
Pyélonéphrite	Traitement	CIT jusqu'à guérison complète et 2 semaines au moins après arrêt de l'antibiothérapie, si infection aiguë. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si infection récidivante.
Rapports sexuels sous l'influence de drogues de synthèse; Chem-Sex	Traitement	CIT de 12 mois après avoir pratiqué du Chem-Sex.
	Voir aussi	Drogue, usage de Rapports sexuels, partenaires intimes

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Rapports sexuels, partenaires intimes

Traitement

CIT de 4 mois après:

- Contact sexuel avec une nouvelle ou un nouveau partenaire. Une "nouvelle ou un nouveau partenaire" signifie :

- une personne avec laquelle la donneuse ou le donneur n'avait pas encore eu un contact sexuel OU - une personne avec laquelle la donneuse ou le donneur avait eu une relation sexuelle qui a pris fin et avec laquelle la donneuse ou le donneur avait repris de nouveau un rapport sexuel au cours des 4 derniers mois.

- Retour du partenaire sexuel ayant séjourné dans des pays où les taux de VHB, VHC et VIH sont élevés pendant 6 mois ou plus ou ayant reçu des transfusions sanguines dans ces pays (après le retour du partenaire);
- dernier contact sexuel avec un partenaire qui s'injectent des drogues (actuellement).

CIT de 6 mois après le dernier contact sexuel :

- Avec un partenaire atteint d'hépatite B ou C.


CIT de 12 mois

après le dernier contact sexuel :


- Avec changement de partenaire au cours des 4 derniers mois (plus de 2 partenaires);
- Avec des partenaires dont le test de dépistage du VIH ou de la syphilis est positif;
- Avec des partenaires ayant eu des rapports sexuels avec plus de 2 personnes au cours des 4 derniers mois;
- Avec les sexworker. Cette période peut également être réduite à 4 mois à condition que les sexworker aient complètement cessé leur activité pendant au moins 12 mois.

Se référer Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.


Se référer "Formulaire d'information pour les donneuses et donneurs de sang".

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


	Voir aussi	Chlamydia, infection Gonorrhée Hépatite B Hépatite B, partenaire sexuel Hépatite C Hépatite C, partenaire sexuel Lymphogranulome vénérien Prostitution, Sexworker Rapports sexuels sous l'influence de drogues de synthèse; Chem-Sex Syphilis Syphilis, partenaire sexuel VIH
Raynaud, maladie	Traitement	CIT si symptomatique. CID si associée à une maladie sous-jacente.
Rectocolite ulcéro-hémorragique	Traitement	CID.
Réduction du poids, chirurgical	Se référer à	Chirurgie viscérale
Refroidissement	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet. CIT de 2 semaines après disparition d'une fièvre > 38° C.
	Voir aussi	Fièvre
Rétinite pigmentaire	Définition	Mort des cellules de la rétine, généralement d'origine génétique.
	Traitement	CID après confirmation du diagnostic par le médecin traitant ou l'ophtalmologue, si symptomatique d'une maladie de Refsum.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Rhinite	Traitement	CIT pendant la durée du traitement d'une rhinite chronique. CIT jusqu'à disparition des symptômes si rhinite aiguë.
	Voir aussi	Refroidissement
Rhumatisme articulaire aigu	Traitement	CIT de 2 ans après poussée isolée sans atteinte valvulaire. CID si poussées récidivantes et/ou prescription d'un traitement antibiotique au long cours.
	Se référer à	Rhinite
Rhume des foins	Définition	Allergie saisonnière au pollen affectant principalement la conjonctive et la muqueuse nasale.
	Traitement	Se référer à Maladies allergiques
Rickettsiose	Traitement	CIT de 2 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet.
Risque, professions ou loisirs à	Définition	Professions à risques : conducteurs de locomotive, car, bus, poids lourds, pilotes; conducteurs ou opérateurs de machines de chantier, de grues, personnel travaillant sur des échelles ou des échafaudages, plongeur (scaphandriers). Loisirs à risques : plongée, alpinisme, parachutisme et parapente, vol à voile ou à moteur, courses de voitures ou de motos.
	Traitement	Après un don de sang, il faut respecter un délai d'attente d'au moins 12 heures avant de pratiquer des activités/loisirs qui pourraient mettre en danger le donneur de sang directement ou d'autres personnes. Le respect des consignes spécifiques de la profession ou du loisir à risque relève de la responsabilité du donneur. Eviter les efforts physiques importants le jour du don.
Rotavirus/Entérovirus	Se référer à	Diarrhée

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Rougeole	Définition	Maladie infectieuse très contagieuse, survenant habituellement dans l'enfance, due à un virus à ARN de la famille des paramyxovirus.
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact
Rubéole	Définition	Maladie infectieuse très contagieuse provoquée par le virus de la rubéole (Rubivirus rubellae).
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact
Salmonella typhi et paratyphi	Se référer à	Fièvre typhoïde
Salmonellose, contact	Se référer à	Gastro-entérite, contact
Salpingite	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
Sangsues, application	Traitement	CIT de 4 mois après l'application des sangsues
Sarcoïdose	Traitement	Accepter si poussée aiguë de courte durée ne nécessitant aucun traitement.
		CID si maladie chronique.
Scarlatine	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et/ou 2 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie.
Scarlatine, contact	Traitement	CIT de 3 jours après le contact.
Schistosomiase	Se référer à	Bilharziose

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Schizophrénie	Définition	Un groupe de pathologies psychiques graves qui s'accompagnent d'une perte de contact avec la réalité. En font partie le trouble schizo-affectif, le trouble schizo-forme.
	À noter	Évaluation au moins une fois de la maladie de base par le médecin du SRTS. La polymédication et les hospitalisations doivent être prises en compte.
	Traitement	Accepter si stable le jour du don. Si la perte de contact avec la réalité de la schizophrénie ne peut pas être évaluée, l'aptitude au don doit être évaluée par le médecin du SRTS.
Sclérose en plaques	Traitement	CID.
Sclérose latérale amyotrophique	Traitement	CID.
Sécheresse oculaire (syndrome de Sicca)	Définition	Sécheresse de l'œil due à différentes causes.
	Traitement	Accepter également en cas de traitement par des gouttes de sérum autologue Exclusion en présence d'une maladie auto-immune systémique
Sein, biopsie de nodule	Traitement	CIT dans l'attente d'un complément d'information si doute diagnostique. CIT d'1 mois après l'excision si nodule mammaire bénin et jusqu'au rétablissement complet. En cas d'affection maligne sous-jacente, même traitement que pour le critère « cancer ».
	Voir aussi	Cancer Chirurgicale, intervention (Généralités)
	Traitement	CIT de 6 mois après guérison complète.
Shigellose	Traitement	CIT de 6 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Gastro-entérite, contact

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Shigellose, contact	Se référer à	Gastro-entérite, contact
SIDA	Se référer à	VIH
Sinusite	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet après une crise aiguë. CIT si traitement ou utilisation d'un décongestionnant si maladie chronique.
Situations à risque	Définition	Situation pouvant affecter la santé du donneur ou du receveur.
	À noter	voir aussi "Formulaire d'information pour les donateurs de sang" (de 1 à 12).
Souffle cardiaque	Traitement	Accepter si asymptomatique, relatif à la position et léger jusqu'à 2/6. Tous les autres types de souffles cardiaques doivent être clarifiés auprès du médecin traitant. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS.
Sphérocytose héréditaire	Traitement	CID
Splénectomie	À noter	Vérifier le diagnostic de la pathologie sous-jacente.
	Traitement	CIT de 6 mois après l'intervention et jusqu'au rétablissement complet si splénectomie post-traumatique.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Spondylarthrite ankylosante	Traitement	CIT de 12 mois après traitement par des anticorps monoclonaux. CID seulement si atteinte cardio-vasculaire.
Spondylodèse	Traitement	CIT de 6 à 12 mois après l'intervention en l'absence de complication.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Stérilet	Traitement	CIT pendant 72 heures après la mise en place.
-----------------	------------	---

Stérilisation tubaire	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)

Stérilité	Se référer à	Grossesse, désir de
------------------	--------------	---------------------

Strabisme	Se référer à	Chirurgie ophtalmologique
------------------	--------------	---------------------------

Surdité brutale neurologique	Traitement	Accepter si traumatisme sonore.
		Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS dans tous les autres cas.

Syndrome de Martin Bell	Se référer à	Paralysie faciale à frigore
--------------------------------	--------------	-----------------------------

Syndrome de Sicca	Se référer à	Sécheresse oculaire (syndrome de Sicca)
--------------------------	--------------	---


Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)	Se référer à	Kyste(s) ovarien(s)
--	--------------	---------------------

Syphilis	Traitement	CID.
-----------------	------------	------


Syphilis, partenaire sexuel	Traitement	CIT de 12 mois si les tests de dépistage restent négatifs.
------------------------------------	------------	--

Tachycardie	Traitement	CIT si pouls > 100/min après plusieurs mesures.
--------------------	------------	---


Tatouage – ablation	Se référer à	Traitement laser – de la peau
----------------------------	--------------	-------------------------------

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Tatouage/ Tattoo	Traitement	CIT de 4 mois Voir aussi: Tatouage – ablation.
TDAH (Trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité)	Traitement	Accepter, même en cas de traitement par le méthylphénidate (p. ex. Ritaline®).
Thalassémie	Définition	Anomalie génétique de la synthèse de l'hémoglobine.
	À noter	L'élément déterminant est la manifestation clinique et non la génétique.
	Traitement	Accepter si la donneuse ou le donneur est porteur/-se d'une alpha ou bêta-thalassémie mineure, qu'il est en bonne santé et que son taux d'hémoglobine se situe dans les valeurs admises. CID si thalassémie majeure ou intermédiaire.
Thrombocytémie primitive	Traitement	CID.
Thrombocytopathie	Traitement	CID.
Thrombose coronarienne	Traitement	CID.
Thrombose de l'artère ophtalmique	Définition	Occlusion d'artères, ce qui entraîne une diminution de l'irrigation sanguine de la rétine ; il s'agit d'un "accident vasculaire cérébral dans l'œil" ou infarctus.
	Traitement	CID
Thrombose des sinus veineux cérébraux	Traitement	CID.
Thrombose oculaire	Définition	Occlusion de veines, ce qui entraîne une diminution de l'irrigation sanguine de la rétine.
	Traitement	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Thrombose, artérielle	Traitement	CID.
Thrombose, tendance héréditaire aux	Voir aussi	Coagulation, anomalies de la Thrombose, artérielle Thrombose, veineuse profonde Thrombose, veineuse superficielle
Thrombose, veineuse profonde	À noter	L'incidence de maladie thromboembolique veineuse récidivante ne dépend en rien de la durée du traitement anticoagulant (phénomène de rebond) et se monte à environ 5-10%.
	Traitement	CIT de 12 mois après l'arrêt du traitement anticoagulant. CID si récidive.
	Voir aussi	Thrombose des sinus veineux cérébraux Thrombose oculaire
Thrombose, veineuse superficielle	À noter	Traitement anticoagulant.
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète. CID si récidive.
Thyroïdite auto-immune	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et en l'absence de symptômes.
Thyroïdite de Hashimoto	Se référer à	Thyroïdite auto-immune
Tique, piqûre de	Traitement	CIT de 4 semaines après piqûre de tique en l'absence de symptomatologie évocatrice d'une borréliose.
	Voir aussi	Lyme, maladie de Rickettsiose
Toxicodépendance	Se référer à	Drogue, usage de

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Toxoplasmose	Traitement	CIT de 6 mois après guérison.
Trachéite	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet.
Traitement laser – de la peau	Définition	Application d'un laser sur une peau intacte à des fins paramédicales ou esthétiques, par exemple pour l'élimination des taches cutanées, des tatouages ou des poils.
	Traitement	Accepter si la peau est intacte et non irritée. CIT dans tous les autres cas.
	Voir aussi	Plaie
Transfusion sanguine ou traitement avec des médicaments dérivés du plasma (PDMP)	Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Produits sanguins labiles : CE, CP, PFC homologues. • Produits sanguins stables (PDMP) (p.ex. albumine, immunoglobulines et facteurs de coagulation extraits du plasma). <p>(Les facteurs de coagulation recombinants sont produits par génie génétique).</p>
	À noter	<p>Faire préciser lors de l'anamnèse la pathologie sous-jacente.</p> <p>Après chaque transfusion sanguine, une recherche d'anticorps irréguliers doit être réalisée.</p>
	Traitement	<p>Accepter seulement après traitement par produits recombinants, en l'absence de CI en relation avec la maladie sous-jacente.</p> <p>CIT de 4 mois si des produits sanguins labiles et/ou stables ont été administrés.</p>
	Voir aussi	<p>Chirurgicale, intervention (Généralités)</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Transgender / Personne trans	Définition	<p>S'adresser aux personnes donneuses non binaires ou de genre divers comme elles le demandent. Il est important de connaître le sexe biologique pour des raisons de sécurité de la personne donneuse comme receveuse. Choisir les valeurs limites d'Hb, l'intervalle entre les dons ainsi que le volume de prélèvement lors d'aphérèses qui correspondent le mieux au sexe hormonal. En cas de doute, appliquer les critères les plus prudents.</p> <p>Le plasma des personnes qui sont ou ont été biologiquement des femmes ne peut pas être utilisé pour fabriquer un produit FFP thérapeutique (risque: TRALI).</p>
-------------------------------------	------------	---

	Traitement	CIT pendant la phase de transition médicale.
--	------------	--


	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
--	------------	--

Transplantation	Traitement	<p>Accepter</p> <p>si tissu, organe ou cellules autologues ou produits de transplantation qui en sont dérivés (en fonction de la maladie sous-jacente).</p> <p>CID</p> <ul style="list-style-type: none"> • s'il s'agit de tissu, organe, cellules (y compris les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux) allogéniques ou de produits de transplantation qui en sont dérivés • si xénotransplantation • si transplantation de cellules souches (autologue et allogénique)
------------------------	------------	--


Transplantation de la dure-mère	Traitement	CID
--	------------	-----

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Traumatisme cranio-cérébral (TCC)	Définition	<p>Lésion du cerveau et/ou de la boîte crânienne produite soit par un choc direct à la tête, soit par une succession brusque d'accélération et de décélération de la tête et de la colonne cervicale.</p> <p>Le terme couvre la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commotion cérébrale (commotio cerebri) • contusiocontusion cérébrale (contusio cerebri) • compressiocompression cérébrale (compressio cerebri)
	Traitement	Accepter si rétablissement complet et absence de limitations fonctionnelles.
	Voir aussi	Chirurgie neurologique Epilepsie
Trouble bipolaire	Définition	Anciennement trouble maniaco-dépressive.
	À noter	Toujours évaluer l'état psychique et la capacité de résistance.
	Traitement	<p>Accepter si stable le jour du don.</p> <p>CIT d'1 mois après la dernière prise de médicaments contenant de l'acide valproïque ou de la carbamazépine (tératogènes).</p> <p>Si le statut stable ne peut pas être déterminé, l'aptitude au don doit être évaluée par le médecin du SRTS.</p>
Trouble déficitaire de l'attention/ hyperactivité	Se référer à	TDAH (Trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité)
Trouble panique	Définition	Un trouble anxieux, caractérisé par plusieurs attaques de panique par mois et par une anxiété d'anticipation ou un comportement d'évitement associé, avec des restrictions dans la vie quotidienne.
	Traitement	<p>Accepter si stable le jour du don.</p> <p>Si le statut stable ne peut pas être déterminé, l'aptitude au don doit être évaluée par le médecin du SRTS.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Troubles du rythme cardiaque	Traitement	<p>Accepter si arythmie fonctionnelle (respiratoire).</p> <p>Accepter lors d'extrasystole (extrasystoles ventriculaires ou extrasystoles supra-ventriculaires), si asymptomatique et uniquement sporadique.</p> <p>Accepter après ablation, si efficace, rétablie et sans médicaments.</p> <p>CID si fibrillation auriculaire, même traitée par des médicaments.</p> <p>CID si origine organique.</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si origine inexplicée.</p>
Trypanosoma cruzi	Se référer à	Chagas, maladie de
Trypanosomiase africaine	Traitement	CID.
Tuberculose	Traitement	<p>CIT de 2 ans après la fin des soins médicaux et l'arrêt du traitement.</p> <p>CID si récurrence sous traitement.</p>
	Voir aussi	Mantoux, test
Tuberculose, contact	Se référer à	Mantoux, test
Tunnel carpien, opération	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Turner, syndrome de	Traitement	CID si poids inférieur à la norme et/ou cardiopathie congénitale.
Urétrite non spécifique	Traitement	<p>CIT jusqu'au rétablissement complet après une poussée aiguë et 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie.</p> <p>CID si maladie chronique.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3


Urinaires, infection des voies	Traitement	CIT jusqu'au rétablissement complet et 2 semaines après la fin de l'antibiothérapie. Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si infections à répétition.
Urticaire	Définition	Apparition de tuméfactions rouges, prurigineuses, légèrement surélevées. L'urticaire est souvent provoquée par une réaction allergique à des médicaments ou à des piqûres ou morsures d'insectes, ou par une maladie auto-immune et, plus rarement, des stimuli physiques tels que la température, la pression ou le soleil. L'éruption persiste habituellement moins de 24 heures.
	Traitement	CIT si urticaire généralisé, jusqu'à guérison complète.
Uveitis	Définition	L'uvéite est une inflammation oculaire impliquant la membrane vasculaire (uvéa) de l'œil.
	À noter	Se renseigner sur la maladie de base.
	Traitement	Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS
Valvulopathie	Traitement	Se référer à: Maladies cardio-vasculaires
Vaquez, maladie de	Se référer à	Polycythémie primitive
Varicelle	Définition	Affection virale survenant lors d'une primo-infection par le virus varicelle-zona (herpès virus).
	Traitement	CIT d'1 mois après guérison complète.
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact
Varices, traitement chirurgical	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Varicocèle, opération	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Variole du singe	Traitement	<p>CIT de 21 jours après rétablissement complet</p> <p>CIT de 21 jours après un contact étroit (partenaire intime, personne vivant dans le même ménage) avec une personne malade.</p>
Vasectomie	Traitement	CIT d'1 mois après l'intervention.
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités)
Verrue	Traitement	Accepter si traitement exclusivement local et absence de lésion des téguments.
Vertiges	Traitement	CIT lors de symptômes et sous traitement. Clarification si cause inconnue.
Vésicule biliaire, opération	Se référer à	Cholécystectomie
VIH	Traitement	<p>CIT de 4 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> après avoir séjourné pendant 6 mois ou plus dans des pays où le taux de VIH est élevé. <p>CID en cas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> infection confirmée par le VIH; injection de drogues (actuellement ou dans le passé). <p>Se référer au "Formulaire d'information pour les donateurs de sang".</p> <p>Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>
	Voir aussi	<p>Prostitution, Sexworker</p> <p>Rapports sexuels sous l'influence de drogues de synthèse; Chem-Sex</p> <p>Rapports sexuels, partenaires intimes</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

VIH Intimpartenaire	Traitement	<p>CIT de 12 mois à partir du dernier contact sexuel avec un partenaire dont l'infection par le VIH est confirmée.</p> <p>CID du donneur avec un contact continu.</p>
Virus West-Nile, infection	Traitement	<p>CIT d'1 mois après le retour d'un voyage d'une zone à risque.</p> <p>CIT de 4 mois après guérison complète.</p> <p>Se référer au Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>
Virus Zika	Traitement	<p>CIT d'1 mois après le retour d'une zone à risque.</p> <p>CIT de 3 mois après rapport sexuel avec un partenaire souffrant d'une infection avérée au virus Zika</p> <p>CIT de 4 mois après guérison complète.</p> <p>Se référer Annexe Art. 7.2: Travelcheck pays ou zones à risque de maladies infectieuses.</p>
Vitiligo	Traitement	CID si symptomatique d'une affection systémique.
Vitrectomie	Définition	La vitrectomie désigne l'ablation chirurgicale d'une partie ou de la totalité du corps vitré de l'œil.
	Traitement	Se référer à Chirurgie ophtalmologique.
Von Recklinghausen, maladie	Se référer à	Neurofibromatose
Von Willebrand, syndrome de	Traitement	<p>CID si symptomatique.</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS si diagnostique au cours d'un bilan familial.</p>
Yersiniose	Se référer à	Shigellose

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Critères d'aptitude au don de sang	
	Type de document : ANH	
	En vigueur à partir de : 01.02.2026	Version 3

Zona	Définition	Affection virale provoquée par le virus Varicelle-Zona (herpès virus). Réactivation endogène d'une primo-infection dans l'enfance, généralement la varicelle.
	Traitement	CIT d'1 mois après rétablissement complet (assèchement des lésions).
	Voir aussi	Maladies infectieuses, contact