



Trasfusione CRS

Change File Book – Criteri d'attitudine alla donazione di sangue

Versione 3

In vigore dal 01.02.2026

In generale: i riferimenti ai capitoli sono stati sostituiti con riferimenti a articoli e allegati.

Anticoagulazione	Misure: Accettare dopo una singola somministrazione preventiva. CIT di 1 mese dopo la fine del trattamento con anticoagulanti (sottocutaneo). CIT di 1 ÷ 3-mese dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali, se il principio attivo non è teratogeno (elenco dei principi attivi teratogeni: cfr. articolo 7, allegato 7.1). CIT di 3 mesi dopo l'ultima dose, se il principio attivo è teratogeno o sconosciuto. Anticoagulanti teratogeni: • Fenprocumone (Marcoumar®) • Acenocumarolo (Sintrom®) • Warfarin (Coumadin®) • Fluindioni (Previscan®) Aggiunta a «Vedere anche» Nuovo: Rispettare: Informarsi sull'anamnesi della patologia.
Artrite	Misure: CIT 6 mesi invece di 12 mesi dopo la fine di un trattamento con metotrexato.
Cellule Staminali, donazione di	Misure: CIT finché il processo di donazione è in corso (a partire dalla richiesta di tipizzazione di controllo). CIT di 12 mesi dopo la donazione di cellule staminali.
Chirurgia neurologica	Misure: CIT di 12 mesi se l'intervento con apertura della dura madre è avvenuto in Svizzera. CIT se l'intervento con apertura della dura madre è avvenuto all'estero. CIT per il trapianto di meningi (dura madre). CIT ad eccezione degli interventi che non aprono la dura-madre.



Coagulazione, disturbi della	CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione di derivati della cumarina (proprietà teratogena). Vedere anche: Anticoagulazione
Cornea, trapianto (Cheratoplastica)	Aggiunta del termine cheratoplastica.
Creutzfeldt-Jakob, malattia di (MCJ/ CJD)	Completamente rielaborato.
Dentario, trattamento	Misure: Impianti revisionati.
Età	Nota Bene: I donatori per aferesi di età compresa tra i 65 e i 75 anni dovrebbero essere ammessi solo se le seguenti condizioni possono essere soddisfatte: • Donatori esperti • Autorizzazione medica annuale, fondamentale come nei donatori di sangue intero più anziani. In particolare, l'autorizzazione dei donatori per aferesi dovrebbe essere basata su un'intervista e/o sul questionario standardizzato che valuta non solo i rischi cardiovascolari ma anche i rischi aggiuntivi di osteoporosi
Frattura	Misure: Aggiunta: Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione per frattura spontanea. CIT di 1 mese dopo la fine dell'anticoagulazione (sottocutanea o orale, a meno che non sia teratogena) e/o l'allontanamento del gesso. CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione orale di anticoagulanti sconosciuti o teratogeni. Nuovo link: Rinvio a: Anticoagulazione e Osteoporosi.



Impianto	Misure: Accettare gli impianti se inseriti in Svizzera dopo il 1993. Accettare gli impianti inseriti al di fuori della Svizzera, a condizione che per la loro fabbricazione non siano stati utilizzati tessuti o cellule di origine umana o animale o loro derivati. CID degli impianti se sono stati inseriti in Svizzera prima del 1993. CID per impianti inseriti al di fuori della Svizzera, se nella produzione sono stati utilizzati tessuti o cellule di origine umana o animale o loro derivati. Sono ammessi impianti dentali quali Cerabone®, Bio-Oss®, Bio-Oss Collagen® e Bio-Gide®. Per gli altri impianti non elencati per la cui fabbricazione sono impiegati tessuti o cellule di origine umana o animale oppure loro derivati, l'attitudine alla donazione è concessa soltanto se il certificato CE e la dichiarazione CE di conformità dell'impianto, sono stati rilasciati secondo il nuovo regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. Gli impianti con certificato CE rilasciato secondo la previgente direttiva relativa ai dispositivi medici 93/42/CEE (MDD) possono essere ammessi su valutazione del servizio medico, se il fabbricante conferma per iscritto al STR che in base all'origine della materia prima e alla procedura di fabbricazione di questi dispositivi, è garantita l'assenza di agenti patogeni (incl. virus e prioni) di malattie infettive. I certificati CE devono essere verificati al minimo, quanto alla correttezza, sui seguenti punti: direttiva/regolamento, durata di validità/data di scadenza del certificato, nome del fabbricante e designazione del dispositivo.
Microblading/ Mikroblading	Aggiunta Mikroblading
Operazione / Intervento (in generale)	Misure: CIT: • calcolare 1 mese supplementare dopo la fine di un trattamento con anticoagulanti (sottocutanei o orali, a meno che non siano teratogeni); • calcolare 3 mesi supplementari dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali teratogeni; CID: • se sussiste un rischio in relazione ad una infezione da prioni (ad es. trasfusione di sangue dopo il 1980, trapianto di cornea, di meningi dura madre);
Osteoporosi	Nuovo criterio
Psoriasi	Misure: CIT 6 mesi invece di 12 mesi dopo la fine di un trattamento con metotrexato.
Tatuaggi/ Tattoo	Aggiunta al termine Tattoo Nuovo link: Vedere anche: Tatuaggio – rimozione



Trapianto di dura madre	Nuovo criterio, CID diretta
Trasfusione di sangue o trattamento con medicinali plasmaderivati (PDMP)	Misure: Modifiche a causa della MCJ
Trattamento laser – pelle	Nuovo link "Rinvio a" da Tatuaggio – rimozione (Nuovo) Definizione: