



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ  
TRANSFUSION CRS SUISSE  
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

## Seitenhistorie

● Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

### Versionen im Vergleich

◀	<b>4</b> Tiziana Janner 25.06.2024	<b>Aktuell</b> Stefanie Mast 11.10.2024
---	--	---

[Seitenhistorie anzeigen](#)

### Schlüssel

Diese Zeile wurde hinzugefügt.

~~Diese Zeile wurde entfernt.~~

Formatierung wurde geändert.

**Majorversion:** 2

**Minorversion:** 2.0

**Dokumentnummer:**  
3429

 Auszug

## Generalità

In linea di massima, l'assunzione di medicinali non costituisce una controindicazione per la donazione di sangue.

1. In una prima fase occorre verificare per quale malattia sottostante viene assunto il medicinale e se la malattia sottostante implica una controindicazione temporanea o definitiva dalla donazione. In questo caso si deve procedere come indicato nei «Criteri d'attitudine alla donazione di sangue» (allegato articolo 7). In questo capitolo sono elencati i riferimenti ai criteri di idoneità alla donazione per i vari gruppi terapeutici.
2. Accettare la donazione se

- a. applicazione topica (attenzione -> applicazione estesa di steroidi)
- b. assunzione sporadica o automedicazione con determinati medicinali come vitamine, prodotti omeopatici, anticoncezionali, antidolorifici, sonniferi, a condizione che il donatore sia sano e che siano seguite le procedure previste dal presente

**capitolo**

3. a. allegato .
  - Attenzione: se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici.
4. CIT in caso di assunzione di medicinali,
  - a. che compromettono la funzione piastrinica (vedi esempi alla voce inibitori dell'aggregazione Tc, ad es. acido acetilsalicilico)
5. a. e FANS ): se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici;
  - b. che si sono dimostrati teratogeni: derivati della vitamina A (Roaccutan®, Acitretin, Neotigason®, Etretinat®), finasteridi (Propecia®, Proscar®), sali di litio (Lithiofor®, Quilonorm®), alcaloidi della segale cornuta (Dihydergot®, Cafergot®), vismodegib (Erivedge®), inibitori della 5-alfa-reduttasi (dutasteride (Avodart®)), metotrexato, clomifene (Clomid®) e derivati della cumarina. Le CIT per questi medicinali sono indicati in questo capitolo e tra i criteri rilevanti di idoneità
6. a. contengono principi attivi teratogeni: Acenocumarolo, Acitretina, Alitretinoina, Anastrozolo, Carbamazepina, Carbimazolo, Clomifene, Ciclofosfamida, Danazolo, Dietilstilbestrolo, Dutasteridum, Eslicarbatsepina, Etretinato, Finasteride, Fluindione, Isotretinoina, Letrozolo, Leuprorelinum, litio, metotrexato, mifepristone, misoprostolo, acido micofenolico, penicillamina, fenobarbital e farmaci simili, fenprocumone, fenitoina, tamoxifene, topiramato, tretinoina, acido valproico, verteporfina, vismodegibum e warfarin. Le indicazioni e gli esempi di nomi di preparati sono riportati nell'elenco dei farmaci. L'elenco sopracitato viene revisionato annualmente dal T-CH e aggiornato in consultazione con il gruppo di lavoro BSH [ R8 ]. Le CIT per questi medicinali sono indicati nell'allegato art. 7.1 e nei relativi criteri di attitudine alla donazione.
7. CID in caso di
  - a. medicinali autoiniettati non prescritti dal medico
  - b. droghe autoiniettate

Se un medicinale non è incluso nell'elenco ma le sue proprietà rendono opportuno una CIT secondo il punto 3), si raccomanda una CIT pari a 5 volte l'emivita

1. a. .

In caso di dubbio, rivolgersi al medico del STR.

1. a.

Procedura	
<b>Controindicazione definitiva (CID)</b>	Misura di durata illimitata e di solito irreversibile. Il donatore deve essere informato in modo comprensibile.
<b>Controindicazione temporanea (CIT)</b>	Misura di durata limitata. Il donatore deve sapere quando e perché sarà riammesso.
<b>Accettare</b>	Il donatore è ammesso alla donazione.

## Elenco dei medicinali

La seguente tabella contiene un elenco di vari medicinali, suddivisi per gruppi terapeutici, con indicazione dei rispettivi principi attivi o dei nomi commerciali e delle procedure da seguire con riferimento al capitolo «Criteri d'attitudine alla donazione di sangue». Gli elenchi dei nomi commerciali non sono esaustivi. A questo proposito si rimanda alla piattaforma di Swissmedic (AIPS) o, per i medicinali stranieri, a pharmawiki.

Gocce oculari ,Liderma Antigottosi

Uricosatici (ad es. Allopur®, Allopurinolo®, Mephanol®, Zyloric®)

Uricosurici (Santuril® Medicinali tireostatici (Neo-Mercazol® Ormoni Ormoni tiroidei (ad es. Eltroxin®, tiroxina) ): Antiaritmici (ad es. Isoptin® La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante .Alocapil®, Finacapil®, Finasterid® o Propecia® - (Glomid®) - (Erivedge®) Mepha®retard - e Proscar® - (Avodart®) (Duodart®) : CID in caso di trattamento con ormoni derivati da tessuti umani - MGJ

Gruppi terapeutici	Principi attivi e/o nomi dei preparati	Procedura
Anticoagulanti	<b>Generale</b>	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
	<b>Bloccante del recettore ADP</b> (recettore dell'adenosina difosfato, P2Y <sub>12</sub> ):  Clopidogrel (ad es. Plavix®/ DuoPlavin®)  Prasugrel (Efient®)  Ticagrelor (Brillique®)	Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni.
	<b>Antiaggreganti.</b> <b>Prostaglandine :</b>  Iloprost (Ilomedin®)  Prostaciclina (Flolan®)	
	<b>Inibitori della COX-1:</b>  ASA (Aspirina®, Aspirina Cardio®, ASA Cardio Spirig® 100, Cardiax®-ASS, Kardégic®)  +Clopidogrel: DuoPlavin® 200/25mg retard	

	<p><b>Antagonisti del fattore Xa:</b></p> <p>Edoxaban (Lixiana®)</p> <p>Fondaparinux (Arixtra®)</p> <p>Rivaroxaban (Xarelto®)</p> <p>Apixaban (Eliquis®)</p> <p><b>Inibitori della glicoproteina IIb/IIIa:</b></p> <p>Abciximab (Reopro®)</p> <p>Eptifibatide (Integrilin®)</p> <p>Tirofiban (Aggrastat®)</p> <p><b>Eparine</b></p> <p><b>Antagonisti della trombina:</b></p> <p>Dabigatran (Pradaxa®)</p> <p>Bivalirudina (Angiox®)</p> <p>Argatroban (Argatra®)</p>	<p>Vedere anticoagulanti in generale.</p>
	<p><b>Antagonisti della vitamina K /cumarine:</b></p> <p>Fenprocumone (Marcoumar®) Acenocumarolo (Sintrom®)</p> <p>Warfarin (Coumadin®)</p> <p>Fluindione (Previscan®)</p>	<p>CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).</p>
<p>Analgesici /</p> <p>Antireumatici /</p> <p>Antidolorifici /</p> <p>Analgesici non oppioidi</p>	<p><b>Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS):</b></p> <p><b>Derivati dell'acido antranilico, fenamati:</b></p> <p>Acido mefenamico (ad es. Mefenacid®, Spiralgin®, Ponstan®)</p> <p><b>Inibitori della COX-2:</b></p> <p>Celecoxib (Celebrex®, Celecoxib Pfizer®)</p> <p>Etoricoxib (Arcoxia®)</p> <p><b>Derivati dell'acido acetico e derivati dell'acido indoloacetico:</b></p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni.</p>

Acemetacina (Tilur/Tilur retard)

Bufexamac (Parfenac®)

Diclofenac (ad es. Voltaren®, Diclofenac Actavis)

Etodolac (Lodine®/retard)

Indometacina (ad es. Indocid®-retard, Elmetacin®)

Ketorolac (Acular®, Tora-dol®, KetoVision®)

**Oxicam:**

Lornoxicam (Xefo®)

Meloxicam (Mobicox®)

Piroxicam (ad es. Felden®, Pirosol)

Tenoxicam (Tilcotil®)

**Derivati dell'acido propionico:**

Ibuprofene (ad es. Algifor®, Brufen®)

Dexibuprofene (Seractil®)

Naprossene (ad es. Aleve®, Proxen®)

Dexketoprofene (Kettesse®)

Flurbiprofene (ad es. Froben®)

**Salicilati (ASA)**

Acido acetilsalicilico/

Carbossilato di calcio/

Acetilsalicilato di lisina / vari

(ad esempio Aspirina®, Aspegic®, Alca C®, Alcacyl®  
compresse, ASA tabs, Kardégic®, Tiatral®, Dolopirin®).

**Altri :**

Nimesulide (Aulin®, Nisulid®)

<p>Analgesici / Antireumatici / Antidolorifici / Analgesici non oppioidi</p>	<p><b>Anilidi:</b> Paracetamolo (ad es. Dafalgan®, Panadol®, Dololur®)</p> <p><b>Pirazoloni:</b> Metamizolo (Minalgin®, Novalgina®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Antiallergici (antistaminici)</p>	<p><b>Antistaminici</b> Cetirizina Streuli®, Hista-X, Zyrtec®, Telfast®, Claritine®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Antianemici</p>	<p>Preparati di ferro i.v. Preparati di ferro p.o. Eritropoietina</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Antinfettivi</p>	<p>Antibiotici</p>	<p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p> <p>Agli antibiotici per la terapia dell'acne si applica una regola speciale.</p>
	<p>Antimicotici</p>	<p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p>
	<p>Antiparassitari / Antiprotozoari</p>	<p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p> <p>Profilassi della malaria: accettare prima del viaggio.</p>
	<p>Virostatici (ad es. Zovirax®, Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®)</p>	<p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p> <p>Nota bene: Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®: profilassi pre-esposizione (PrEP) e profilassi post-esposizione (PEP): CIT di 4 mesi dopo la fine del trattamento PEP/ PrEP.</p>
<p>Antidepressivi</p>	<p>Litio (Lithiofor®, Priadel retard®, Quilonorm®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>

		Litio: CIT di 1 settimana dopo l'ultima assunzione (teratogeno).
Antidiabetici	Antidiabetici orali Insuline (ad es. Humalog®, NovoRapid®, Lantus®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antipertensivi		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ansiolitici	Benzodiazepine (ad es. Xanax®, Temesta®, Tranxilium® )	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antigottosi	Uricosstatici (ad es. Allopur®, Allopurinolo®, Mephanol®, Zyloric®) Uricosurici (Santuril®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Cardiovascolari	ACE-inibitori (ad es. captopril, Captosol®, enalapril, Reniten®, ramipril, Triatec®) Alfabloccanti (ad es. doxazosina, urapidil) Antagonisti dell'angiotensina II (ad es. losartan, Coasaar®, valsartan, Diovan®) Betabloccanti (ad es. metoprololo, Beloc®, bisoprololo, Concor® ) Calcioantagonisti (ad es. amlodipina, Norvasc®, nifedipina, Adalat®) Glicosidi cardiaci Digoxin®	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Cardiovascolari	Antiarritmici (ad es. Isoptin®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Citostatici	Metotrexato	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante . Metotrexato: CIT di 6 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno) .

Contraccettivi		Accettare.
Dermatologici	Medicinali sistemici per l'acne: retinoidi (ad esempio Curakne® Isotretinoina	
, Roaccutan®, Tretinac®)	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Isotretinoina (Curakne®, Isotretinoina, Roaccutan® capsule, Tretinac®), tretinoina (Vesanoid®) o alitretinoina (Toctino®): CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione (teratogeno).</p> <p>Etretinato (attualmente non omologato in Svizzera): CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p>	
Dermatologici	Antipsoriasici: acitretina (Neotigason® , Acicutan® )	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Acitretina (Neotigason®): CIT di 3 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p>
Diuretici		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ferro	<del>Decisione sull'idoneità alla donazione lasciata alla discrezionalità del medico del STR.</del>	
Disassuefanti	Nicotina: Zyban®	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Disassuefanti	Alcool: Antabus®, Campral® e derivati	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Disturbo bipolare		
Acido valproico (Convulex®, Depakine® Chrono, Orfiril®, Valproat Sandoz®)		
Carbamazepina (Carsol®, Tegretol®, Timnoil®)		
)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.	

<p>Ormoni</p>		
<p>Acido valproico e carbamazepina: CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione.</p>		
<p>Emicrania</p>	<p>Topiramato (Topamax®, Topiramato Sandoz®, Topiramato Spirig HC®)</p>	
<p>)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante .</p> <p>Topiramato: CIT di 1 mese dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno) .</p>	
<p>Endometriosi</p>		
<p>Leuprorelini acetat (Lucrin Depot®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Leuprorelini acetat: CIT di 2 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p>	
<p>Ferro</p>		<p>Decisione sull'idoneità alla donazione lasciata alla discrezionalità del medico del STR.</p>
<p>Gocce oculari</p>		<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Ipnotici / Sedativi Sonniferi</p>	<p>Barbiturici</p> <p>Benzodiazepine (ad es. Dalmadorm®, Dormicum®, Rohypnol, Zolpidem Streuli®)</p> <p>Preparati fitoterapici</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Immunologici</p>	<p>Bio-immunologici</p> <p>Preparati batterici (ad es. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccalin®, Luivac®, Ribomunyl®)</p> <p>Preparati di origine umana (ad es. Cytotect®, Hepatect®, vaccino passivo antirabbico e antitetanico, Varitect®).</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>

	Preparati di origine animale/terapia cellulare (ad es. preparati di origine bovina come in passato Solcoseryl®).	
Immunosoppressori	Immunosoppressori: metotrexato	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Metotrexato: CIT di 12 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno)
Cardiovascolari	ACE-inibitori (ad es. captopril, Captopril®, enalapril, Reniten®, ramipril, Triatec®) Alfabloccanti (ad es. doxazosina, urapidil) Antagonisti dell'angiotensina II (ad es. losartan, Coasaar®, valsartan, Diovan®) Betabloccanti (ad es. metoprololo, Beloc®, bisoprololo, Concor®) Calcioantagonisti (ad es. amlodipina, Norvasc®, nifedipina, Adalat®) Glicosidi cardiaci Digoxin®	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Cardiovascolari		
)		
.		
Contraccettivi	Accettare.	
Medicinali contro la caduta di capelli	Finasteride ( Alocapil®, Finacopil®, Finasterid® o Propecia®)	
)	Finasteride : CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno).	
Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni	Clomifene (Clomid®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Clomifene

<p>: CIT di 6 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p>		
<p>Oncologici</p>	<p>Vismodegib (Erivedge®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Vismodegib</p>
<p>: CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno ).</p>		
<p>Ormone della crescita</p>		<p>CID in caso di trattamento con ormoni derivati da tessuti umani. MCJ</p>
<p>Ormoni</p>	<p>Medicinali tireostatici (Neo-Mercazol® )</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Ormoni</p>	<p>Ormoni tiroidei (ad es. Eltroxin®, tiroxina)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante .</p>
<p>Psicostimolanti</p>	<p>Metilfenidato (Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p>
<p>Urologici</p>	<p>Medicinali per la prostata:</p> <p>Inibitori della 5-alfa-reduttasi: dutasteride (Avodart®)</p> <p>Dutasteride+tamsulosina (Duodart®), finasteride (Finasterix®, finasteride, Proscar®).</p> <p>L'uso della tamsulosina da sola è autorizzato (ad esempio Pradif®, Tamsulosin T-</p>	
<p>Mepha® retard ).</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Finasteride</p>	
<p>: CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno).</p>		
<p>Dutasteride</p>		
<p>o dutasteride/tamsulosina</p>		

Auszug

: CIT di 6 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).		
Urologici	Disfunzione erettile: ad esempio, Viagra®.	Accettare.
Vasodilatatori		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante
Ormone della crescita		
.		