

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Criteri d'attitudine alla donazione di sangue

RIFERIMENTI

1. Ordinanza sulle autorizzazioni nel campo dei medicinali (OAMed) – Versione in vigore
2. Manuale per la preparazione, l'utilizzazione e la sicurezza di qualità nei componenti sanguigni - Consiglio d'Europa - versione in vigore

Documentazione e principi generali

I criteri di attitudine alla donazione di sangue sono uno strumento di lavoro a salvaguardia della sicurezza del donatore durante la donazione come pure del paziente ricevente. Essi vengono applicati per i donatori di sangue completo, di trombociti e di plasma ad uso terapeutico.

Sono classificati in ordine alfabetico in questo documento (disponibile sul sito internet della T-CH SpA). Essi sono completati dalle liste dei medicinali, dei vaccini e dei paesi o aree a rischio di malattie infettive come pure da certe regole per il prelievo.

I criteri vengono regolarmente aggiornati in conformità alle esigenze europee [2] da parte di un gruppo di lavoro competente ed implementati dalla direzione medica della T-CH SpA. La versione disponibile sul sito internet viene aggiornata costantemente.

I donatori sono valutati da personale formato a questo scopo sotto la responsabilità di un medico del centro trasfusionale. In caso di dubbi concernenti l'idoneità del candidato donatore, il personale non deve accettare la donazione, ma deve prendere contatto con il medico del centro trasfusionale, il quale provvederà ad una valutazione individuale del donatore. Ogni problema nel corso della raccolta dell'anamnesi o dell'esame clinico prima della donazione deve essere interpretato conformemente a questi criteri. Nel caso di una contro-indicazione, il donatore deve ricevere una spiegazione dettagliata sulla causa e sulle relative conseguenze.

In caso di dubbi sull'attitudine alla donazione oppure se si sospetta o si individua un rischio per la salute dei donatori o dei riceventi che non è sufficientemente descritto nei criteri, i casi devono essere riferiti al medico del centro trasfusionale per una presa di decisione. L'informazione deve essere trasmessa poi alla direzione medica di T-CH SpA.

Terminologia

MISURE	
Contro-indicazione definitiva: CID	Misura illimitata nel tempo, irreversibile e definitiva. Il donatore deve essere informato in modo per lui comprensibile.
Contro-indicazione temporanea: CIT	Misura limitata nel tempo. Il donatore è informato a partire da quando sarà nuovamente idoneo.
Accettare	Il donatore è dichiarato idoneo alla donazione.

Il termine "donatore" viene utilizzato indifferentemente per indicare donatori e donatrici.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Ablazione dell'utero	Rinvio	Isterectomia
Aborto spontaneo	Rinvio	Interruzione di gravidanza
Acne	Misure	<p>Accettare i donatori in trattamento antibiotico con Tetraciclina/Eritromicina o Roaccutan® Gel.</p> <p>CIT se presenza di lesioni attive o infette.</p> <p>CIT di 4 settimane dopo l'ultima assunzione di Isotretinoine (Curakne®, Isotretinoina, Roaccutan® Capsule, Tretinac®), di Tretinoina (Vesanoid®) o Alitretinoina (Toctino®).</p> <p>CIT di 2 anni dopo l'ultima assunzione di Etretinat (non è attualmente autorizzato in Svizzera).</p> <p>CIT di 3 anni dopo l'ultima assunzione di Acitretine (Acicutan®, Neotigason®).</p>
ADHD	Rinvio	Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
Ago, ferite da	Vedere anche	<p>Contatto con sangue estraneo</p> <p>Personale ospedaliero</p> <p>Piercing</p> <p>Tatuaggi</p>
Agopuntura	Misure	CIT di 4 mesi se dubbi concernenti la tecnica sterile di lavoro o segni d'infezione batterica oppure l'agopuntura non è stata eseguita da personale medico con aghi monouso.
Alcool	Misure	CIT per i donatori sotto l'influsso dell'alcool.
Alcool, disassuefazione da	Misure	CIT fino al termine della terapia.
Allergia ai medicinali	Rinvio	Allergie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Allergie	Definizione	<p>Le reazioni allergiche (reazioni di ipersensibilità) sono reazioni inadeguate del sistema immunitario a una sostanza normalmente innocua.</p> <p>Gravità e tipi di sintomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado 1: prurito, arrossamento, orticaria, gonfiore • Grado 2: grado 1, rinorrea (naso che cola), raucedine, affanno, nausea, vomito, aumento della frequenza cardiaca, calo della pressione sanguigna, aritmia. • Grado 3: grado 1, vomito, gonfiore delle vie aeree, broncospasmo, shock • Grado 4: grado 1, vomito, arresto respiratorio, arresto circolatorio
	Misure	<p>Accettare se attualmente i sintomi sono assenti o lievi (grado 1) con o senza trattamento (topico, antistaminici, inalanti).</p> <p>CIT in caso di sintomi di grado 2 fino alla scomparsa dei sintomi.</p> <p>CIT in caso di trattamento con corticosteroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia.</p> <p>CIT in caso di trattamento con immunosoppressori (ad es. anticorpi monoclonali (anti-IgE)) fino a 1 anno dopo la fine della terapia.</p> <p>CIT in caso di sintomi di grado 3 o 4 fino a due settimane dopo il completo recupero.</p> <p>CIT in caso di allergia da contatto ai materiali utilizzati durante la donazione di sangue (disinfezione della pelle, guanti, cerotti) se non sono disponibili altre alternative sul posto.</p>
Amebiasi	Definizione	<p>Malattia tropicale data da un parassita.</p> <p>C: diarrea, dolori addominali.</p> <p>T: AB</p>
	Misure	<p>CIT fino alla scomparsa dei sintomi clinici e alla fine del trattamento di una forma intestinale.</p> <p>CIT di 6 mesi dopo la fine del trattamento di una forma viscerale.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Anafilassi	Definizione	L'anafilassi è una reazione allergica acuta, potenzialmente a rischio vita, che si manifesta in persone già sensibilizzate quando entrano di nuovo in contatto con l'antigene scatenante. I sintomi corrispondono ai livelli di gravità 3 e 4 (allergia).
	Misure	CIT di 2 settimane dopo il completo recupero. CID se recidiva (dopo il secondo evento e indipendentemente dall'intervallo tra gli eventi).
Andicappato fisico	Misure	CIT se l'origine dell'handicap costituisce un problema alla donazione di sangue, se non ha interamente compreso e accettato le procedure della donazione di sangue, come pure i test che servono a evidenziare malattie trasmissibili, se il donatore non può sdraiarsi sul letto e in ogni caso se la sua sicurezza viene compromessa.
Andicappato mentale	Misure	CIT se il donatore non è in grado di capire i criteri d'idoneità alla donazione di sangue.
Anemia emolitica	Misure	CID.
Anemia falciforme	Definizione	Malattia ereditaria caratterizzata da una malformazione dell'emoglobina (HbS), porta all'anemia emolitica.
	Misure	CID.
Anemia per carenza di vit b 12 o ac. folico	Nota bene	Fare precisare la causa!
	Misure	CIT fino alla fine del trattamento e ricostituzione delle riserve. CID se una sostituzione permanente è necessaria.
Anemia sideropenica / ferripriva	Nota bene	Adattare eventualmente la frequenza dei prelievi.
	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione.
	Vedere anche	Emoglobina

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Anestesia locale	Rinvio	Narcosi
Aneurisma vascolare	Misure	CID.
Angina	Rinvio	Tonsillite
Angina pectoris	Definizione	Dolore al torace in presenza di cardiopatia coronarica (CHD).
	Misure	CID.
Angor	Rinvio	Angina pectoris
Anticoagulazione	Misure	CIT di 1 mese dopo la fine del trattamento con anticoagulanti (sottocutaneo).
		CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali.
Appendicectomia	Misure	CIT di 1 mese fino all'operazione e guarigione completa.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Aritmia	Rinvio	Aritmia cardiaca
Aritmia cardiaca	Misure	Accettare se aritmia funzionale (respiratoria), in assenza di cardiopatia.
		Accettare se extrasistole (extrasistole ventricolari o sopraventricolari), se asintomatiche e solamente sporadiche.
		Accettare dopo ablazione, se riuscita con successo e compensato senza medicinali.
		CID in caso di fibrillazione atriale, anche se trattata con farmaci.
		CID se la causa è organica.
		Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se la causa non è chiara.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Arteriosclerosi, compresa cardiopatia coronarica	Misure	CID in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • cardiopatia coronarica (compresa angina pectoris) • infarto cardiaco • status dopo intervento di bypass/stent o terapia laser coronarica • aneurisma arterioso • arteriopatia periferica occlusiva • trombosi arteriosa dopo insulto cerebrovascolare («ictus») • attacco ischemico transitorio (AIT)
Arterite temporale	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione
Artrite	Misure	CIT se in fase acuta. CIT se trattamento con antinfiammatori steroidei (contenenti cortisone e derivati). CIT di 12 mesi dopo la fine di un trattamento con metotrexato. CID se l'affezione è grave o necessita un trattamento.
	Vedere anche	Artrite reumatoide Reumatismo articolare acuto
Artrite reumatoide	Misure	CIT di 12 mesi dopo terapia con anticorpi monoclonali. CID unicamente se in presenza di una lesione cardio-vascolare.
Artroscopia	Misure	CIT di 1 mese.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Artrosi	Misure	CIT se in fase infiammatoria acuta.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Ascesso	Misure	CIT fino a guarigione completa, in caso di trattamento antibiotico fino ad almeno 2 settimane dopo la fine del trattamento.
Ascesso cutaneo	Rinvio	Ascesso
Ascesso dentario	Rinvio	Ascesso
Ascesso tonsillare / peritonsillare	Rinvio	Tonsillite
Asma	Definizione	L'asma è caratterizzata da un'inflammatione diffusa delle vie aeree. È causata da molteplici fattori scatenanti che provocano un restringimento reversibile, parziale o completo delle vie aeree. I sintomi comprendono dispnea, senso di oppressione toracica, tosse e respiro sibilante.
	Misure	<p>Accettare se asintomatico al momento della donazione, anche in caso di applicazione sporadica di inalatori o di trattamento preventivo regolare con inalatori (anche corti-costeroidi per via inalatoria).</p> <p>CIT in caso di trattamento con corti-costeroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia.</p> <p>CIT di 1 mese dopo una crisi acuta.</p> <p>CIT in presenza di crisi frequenti o malattia cronica sintomatica, malgrado un trattamento steroideo orale.</p>
Attacco appoplettico	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Autoimmune, malattia	Misure	CID se affezione multiviscerale, dopo valutazione del medico del STR e conferma del medico curante.
	Vedere anche	<p>Artrite reumatoide</p> <p>Guillain-Barré, sindrome di</p> <p>Lupus eritematoso disseminato (led)</p> <p>Tiroidite autoimmune</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Babebiosi	Definizione	Malattia con clinica simile alla quella della malaria.
	Misure	CID.
Basalioma	Rinvio	Cancro
Basedow, malattia di-	Rinvio	Tiroidite autoimmune
Bechterew, malattia di-	Rinvio	Artrite reumatoide
Bendaggio gastrico	Rinvio	Chirurgia viscerale
Besnier-Boeck-Schaumann, sindrome di-	Rinvio	Sarcoidosi
Bilanziosi	Misure	CIT di almeno 12 mesi dopo la fine del trattamento o fino a prova della guarigione da una schistosomiasi (esami dell'urina e delle feci ripetutamente negativi e anticorpi in calo o negativi dopo 12 e 24 mesi).
Blefarite	Definizione	Infiammazione delle palpebre dovuta a varie cause.
	Misure	Rinvio a: <ul style="list-style-type: none"> • Calazio • Orzaiolo
Blenorragia	Rinvio	Gonorrea
Borreliosi	Vedere anche	Lyme, malattia di Zecca, puntura di

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Bradycardia	Misure	<p>Accettare se normalizzazione durante un secondo controllo della pressione sanguigna (eventualmente dopo i pasti) e in assenza di sintomi, se il donatore è molto sportivo o fa un lavoro pesante.</p> <p>Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se polso < 50/min e assunzione di medicinali bradicardizzanti.</p>
	Vedere anche	Ipertensione arteriosa
Bronchite acuta	Misure	CIT fino a guarigione completa e a 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico, se prescritto.
Bronchite cronica	Misure	CID in caso d'infezioni recidivanti invernali frequenti con tosse e espettorazione.
Brucellosi	Definizione	<p>Malattia causata da un battere, che si trova in manzi, maiali e capre.</p> <p>C: vomito, febbre, epatosplenomegalia, artrite, pancitopenia, osteomielite, endocardite, ascessi, meningocencefalite.</p> <p>T: AB.</p>
	Misure	<p>CIT di 3 mesi dopo l'assunzione di alimenti sospetti.</p> <p>CID se l'infezione è confermata.</p>
Caduta di capelli	Misure	CIT di 4 settimane dopo la fine del trattamento con Alo-capil®, Finacapil®, Finasterid® o Propecia®.
Calazio	Definizione	Ostruzione non infettiva di una ghiandola di Meibomio (ghiandola sebacea sulle palpebre).
	Misure	Accettare
Calcolosi renale	Misure	CIT se sintomatico e segni di infezione (febbre, dolori).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Calcolosi renale, operazione	Misure	CIT di 1 mese dopo litotrissia. CIT di 6 mesi dopo l'intervento aperto.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Cancro	Misure	CIT <ul style="list-style-type: none"> • fino a guarigione completa (cicatizzazione completata, asportazione del materiale di sutura) in seguito a escissione di un epitelioma basocellulare se non viene eseguita una chemio o una radioterapia. CIT di 2 anni dopo la fine del trattamento con vismodegib (Erivedge®). • 1 mese dopo l'operazione riuscita di un carcinoma in situ del collo uterino se non viene eseguita una chemioterapia o una radioterapia. • 5 anni dopo un carcinoma del collo uterino con operazione più estesa di una conizzazione e carcinoma del collo uterino con operazione e/o chemioterapia oppure radioterapia, a condizione che il donatore sia sano e sussista una remissione completa. • 5 anni dopo l'ultimo trattamento terapeutico (operazione, radioterapia, trattamento medicamentoso per altre neoplasie, ad es. chemioterapia, terapia ormonale, inibitori del VEGF, ecc.) per tutte le altre neoplasie, a condizione che il donatore sia sano e sussista una remissione completa. <p>Ogni decisione sulla prima donazione dopo la neoplasia spetta al medico del STR e dev'essere documentata.</p>
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Candidosi	Rinvio	Mughetto
Cannabidiolo	Misure	Accettare
Cannabis (canapa indiana)	Misure	CIT se sotto l'influenza di Cannabis.
	Vedere anche	Droga, consumo di

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Carcinoma in situ del collo uterino	Rinvio	Cancro
Cartilagine, operazione della-	Misure	CIT fino alla sua guarigione completa.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Cataratta	Definizione	Opacità della lente.
	Misure	vai a cataratta, operazione.
Cataratta, operazione della-	Definizione	Rimozione del cristallino dell'occhio.
	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento.
	Vedere anche	Chirurgia oftalmologica Operazione / Intervento (in generale)
Cecità	Misure	Accettare se è chiaro che il donatore ha ben compreso e accettato la procedura di donazione di sangue, come pure i test di individuazione delle malattie trasmissibili. Al donatore deve essere altrettanto chiaro che la sua sicurezza durante la donazione non è compromessa. Il questionario deve essere compilato con l'aiuto del personale della donazione.
Cefalee	Misure	Accettare se cefalee occasionali e se al momento della donazione si sente in buona salute.
Celiachia	Misure	Accettare se il trattamento è esclusivamente dietetico, in assenza di problemi ematologici.
Cellule Staminali, donazione di	Misure	CIT di 12 mesi

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Chagas, malattia di-	Definizione	<p>Malattia causata da un parassita, tripanosoma cruzi.</p> <p>C: lesioni cutanee, febbre, ingrossamento di milza, fegato e nodi linfatici, miocardite, miocardiopatia dilatativa.</p> <p>T: AB</p>
	Nota bene	<p>I donatori seguenti potranno essere accettati di nuovo dopo un risultato negativo di un test di laboratorio per Chagas (IF o ELISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se sono nati e/o sono cresciuti in una regione endemica; • se la loro madre è originaria di una regione endemica; • se il loro soggiorno in una regione endemica è durato ininterrottamente più di 6 mesi.
	Misure	<p>Accettare se il soggiorno nella regione endemica è durato < di 6 mesi.</p> <p>CID se la malattia è dichiarata o confermata sulla base di un test di laboratorio anti-T.cruzi positivo.</p> <p>Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
Cheratite (infiammazione della cornea)	Definizione	Infiammazione della cornea, spesso infettiva.
	Misure	CIT di 2 settimane dopo il completo recupero e al termine della terapia.
Chikungunya	Misure	<p>CIT di 1 mese dopo soggiorno in zona endemica.</p> <p>CIT di 4 mesi dopo guarigione completa.</p> <p>Rinvio</p> <p>Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
Chirurgia cardiovascolare	Rinvio	Malattie cardiovascolari
Chirurgia del cavo orale	Misure	<p>Rinvio a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentaria, estrazione • Dentario, trattamento

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Chirurgia dermatologica	Vedere anche	Cancro Operazione / Intervento (in generale)
Chirurgia ginecologica	Nota bene	Ricerca di anticorpi irregolari anti-eritrocitari in caso di gravidanza.
	Vedere anche	Cancro Conizzazione del collo uterino Fibroadenoma del seno, ablazione Interruzione di gravidanza Isterectomia Mastectomia Miomectomia Operazione / Intervento (in generale) Prolasso uterino, operazione Raschiamento Seno, biopsia del nodulo Sterilizzazione tubarica
Chirurgia neurologica	Misure	CID ad eccezione degli interventi che non aprono la dura-madre.
	Vedere anche	Cancro Ernia del disco, operazione Laminectomia Operazione / Intervento (in generale) Spondilodesi
Chirurgia oftalmologica	Nota bene	Occorre sempre chiedere il motivo dell'operazione.
	Misure	CIT di 1 mese
	Vedere anche	Cancro Cataratta, operazione della- Glaucoma, operazione Operazione / Intervento (in generale)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Chirurgia orl	Misure	CIT di 1 mese se chirurgia minore (tonsillectomia, adenoidi, seni, ecc.). Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione.
----------------------	--------	--

Vedere anche	Cancro Mastoide, operazione al- Operazione / Intervento (in generale) Tonsillectomia
--------------	---

Chirurgia ortopedica	Misure	CIT di 1 mese Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione in caso di interventi importanti.
-----------------------------	--------	---

Vedere anche	Cancro Cartilagine, operazione della- Frattura, osteosintesi Impianto Operazione / Intervento (in generale) Protesi totale dell'anca / del ginocchio
--------------	---

Chirurgia renale e urologica	Vedere anche	Calcolosi renale, operazione Cancro Operazione / Intervento (in generale) Prostatectomia Varicocele, operazione Vasectomia
-------------------------------------	--------------	---

Chirurgia toracica	Misure	CIT di 6 mesi dopo l'intervento.
---------------------------	--------	----------------------------------

Vedere anche	Cancro Operazione / Intervento (in generale)
--------------	---

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Chirurgia traumatologica	Vedere anche	Cartilagine, operazione della- Chirurgia ortopedica Frattura Legamento, rottura di un Operazione / Intervento (in generale) Politrauma Splenectomia
Chirurgia viscerale	Misure	CIT di 1 mese di un mese dopo piccoli interventi senza complicazioni, di 6 mesi dopo interventi importanti e dopo guarigione completa. CIT di 3 anni in caso di chirurgia bariatrica (ad es. bendaggio gastrico, gastroplastica, intervento gastrorestrittivo, intervento malassorbitivo).
	Vedere anche	Appendicectomia Cancro Colectomia Colostomia Emorroidi, cura chirurgica Ernia iatale, operazione Ernia inguinale, operazione Gastrectomia Ileostomia Operazione / Intervento (in generale) Polipectomia colica Splenectomia
Cirrosi epatica	Misure	CID.
Cisti ovarica/ovariche	Definizione	Tumore benigno pieno di liquido, che si forma nelle ovaie. Reperto normale e frequente.
	Misure	Accettare. Se maligna, prendere le stesse misure del criterio "cancro".

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Cisti renale/i	Definizione	Cavità piena di liquido all'interno o intorno al rene.
	Misure	Accettare se la funzione renale è normale. Se maligna, prendere le stesse misure del criterio "cancro"
Cistifellea, calcolosi della	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione, se sintomatico.
	Vedere anche	Colecistite
Cistite	Misure	CIT fino a guarigione completa e di 2 settimane dopo la sospensione della terapia antibiotica.
Clamidia, infezione	Nota bene	Informarsi sull'anamnesi relativa ad altre malattie sessualmente trasmissibili e su partner stabili.
	Misure	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento e guarigione completa.
	Vedere anche	Situazioni a rischio
Claudicazione intermittente	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Coagulazione, disturbi della	Definizione	Tendenza a sanguinare e trombofilia
	Misure	<p>Accettare se è definito come “portatore del tratto emofiliaco”, in assenza di sintomi.</p> <p>Accettare in assenza d'episodi di trombosi, anche se presenti, secondo la diagnostica di laboratorio, resistenza all'APC/fattore V Leiden, anomalia del tasso del fattore II, carenza della proteina C e S, carenza dell'anti-trombina III, sindrome dell'omocisteina e presenza di anticorpi anti-fosfolipidi, per ciascuna se senza medicinali, senza eventi trombotici e senza altri sintomi.</p> <p>CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione di derivati della cumarina (proprietà teratogena).</p> <p>Se dubbi, consultare il medico del STR.</p>
	Vedere anche	<p>Embolia polmonare</p> <p>Emofilia a e b</p> <p>Porpora trombocitopenica idiopatica (itp)</p> <p>Trasfusione di sangue</p> <p>Trombosi, arteriosa</p> <p>Trombosi, venosa profonda</p> <p>Trombosi, venosa superficiale</p>
Cocaina	Rinvio	Droga, consumo di
Colecistectomia	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a completa guarigione.
	Vedere anche	<p>Cistifellea, calcolosi della</p> <p>Operazione / Intervento (in generale)</p>
Colecistite	Misure	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e in assenza di sintomi.
	Vedere anche	<p>Cistifellea, calcolosi della</p> <p>Colecistectomia</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Colera	Definizione	Infezione con acqua contaminata. C: diarrea, vomito, morte se liberazione di tossine. T: idratazione, AB
	Misure	CIT di 3 mesi dopo la guarigione.
Colera, contatto	Misure	CIT di 1 settimana dopo il rientro da una zona endemica.
Colica renale	Misure	CIT se sintomatico.
	Vedere anche	Calcolosi renale
Colite	Rinvio	Diarrea
Collo uterino, displasia del-	Rinvio	Cancro
Colon irritabile	Misure	CIT soltanto se il donatore presenta sintomi il giorno della donazione di sangue.
Colostomia	Misure	CID.
Commozione cerebrale	Rinvio	Trauma cranico (SDH)
Congiuntivite	Definizione	Inflammatione della congiuntiva, spesso allergica (febbre da fieno) o infettiva.
	Misure	Rinvio a: <ul style="list-style-type: none"> • congiuntivite infettiva • congiuntivite allergica
Congiuntivite allergica	Definizione	Inflammatione della congiuntiva in genere "raffreddore da fieno".
	Misure	Rinvio a Allergie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Congiuntivite infettiva	Definizione	Infiemmazione della congiuntiva nel corso di un'infezione.
	Misure	CIT di 2 settimane
Conizzazione del collo uterino	Misure	Accettare se nessun altro trattamento è previsto.
	Vedere anche	Cancro Carcinoma in situ del collo uterino Operazione / Intervento (in generale)
Conoscenza, perdita di-	Misure	CID se perdita di conoscenza dopo una donazione, 2 volte consecutive. Se dubbi, consultare il medico del STR.
Contatto con sangue estraneo	Definizione	Lesione da puntura d'ago o contatto di sangue con mucosa o ferita sulla pelle.
	Misure	CIT di 4 mesi.
	Vedere anche	Ferita Personale ospedaliero
Corea di Huntington	Definizione	Malattia ereditaria che porta alla degenerazione di nuclei cerebrali basali, con movimenti del corpo anormali e involontari, in soggetti da 30 a 50 anni.
	Misure	CID.
Cornea, trapianto	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Covid-19	Misure	<p>CIT di 2 settimane, dopo completa guarigione. Se dopo 14 giorni persistono ancora ageusia, anosmia (perdita dell'olfatto o del gusto) e/o tosse secca, il donatore è ammesso.</p> <p>CIT di 2 settimane in caso di test Covid positivo e decorso asintomatico (il giorno del test è considerato come data di riferimento).</p>
	Vedere anche	<p>Influenza, contatto</p> <p>Raffreddore</p>
Crescita, disturbo della	Misure	CID in caso di terapie con ormoni fabbricati da tessuti umani.
Creutzfeldt-Jakob, malattia di	Misure	<p>CID se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più parenti consanguinei sono o sono stati affetti dalla malattia, • se il donatore è stato trapiantato di dura-madre o di cornea, • se ha ricevuto un trattamento di ormoni ipofisari d'origine umana, • se ha soggiornato tra il 1.1.1980 e il 31.12.1996, per una durata di 6 mesi o più nel Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Isola di Man, Isole Normanne, Gibilterra e Isole Falkland), dove l'incidenza della malattia è elevata, • se ha ricevuto una trasfusione sanguigna dopo il 1980.
	Vedere anche	<p>Cornea, trapianto</p> <p>Crescita, disturbo della</p> <p>Trasfusione di sangue</p>
Crohn, morbo di	Definizione	Inflammatione discontinua e segmentale della parete di tutto l'intestino, soprattutto localizzata nell'ileo terminale e nel colon prossimale.
	Misure	CID.
Cushing, malattia	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Degenerazione maculare (AMD)	Definizione	Cambiamento delle cellule del nervo ottico nella macula.
	Nota bene	Si tratta di pazienti a cui viene eseguita un' "iniezione nell'occhio".
	Misure	CID

Dengue (Febbre rossa)	Definizione	Malattia virale delle zone tropicali. C: febbre e sintomi influenzali con guarigione spontanea, fino a febbre emorragica e ev. encefalite.
	Misure	CIT di 1 mese dopo il rientro da una zona endemica. CIT di 4 mesi dopo guarigione completa (in caso di forma non emorragica). Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.

Dentaria, estrazione	Misure	CIT di 1 settimana dopo estrazione dentaria. CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a scomparsa dei sintomi in caso estrazione complicata.
-----------------------------	--------	---

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Dentario, trattamento	Nota bene	<p>Per gli altri impianti non elencati per la cui fabbricazione sono impiegati tessuti o cellule di origine umana o animale oppure loro derivati, l'attitudine alla donazione è concessa soltanto se il certificato CE e la dichiarazione CE di conformità dell'impianto, sono stati rilasciati secondo il nuovo regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.</p> <p>Gli impianti con certificato CE rilasciato secondo la precedente direttiva relativa ai dispositivi medici 93/42/CEE (MDD) possono essere ammessi su valutazione del servizio medico, se il fabbricante conferma per iscritto al STR che in base all'origine della materia prima e alla procedura di fabbricazione di questi dispositivi, è garantita l'assenza di agenti patogeni (incl. virus e prioni) di malattie infettive.</p> <p>I certificati CE devono essere verificati al minimo, quanto alla correttezza, sui seguenti punti: direttiva/regolamento, durata di validità/data di scadenza del certificato, nome del fabbricante e designazione del dispositivo.</p>
	Misure	<p>Accettare se utilizzazione in chirurgia dentale d'impianti di tipo Cerabone®, Bio-Oss®, Bio-Oss Collagen® e Bio-Gide®.</p> <p>CIT di 24 ore dopo pulizia da tartaro.</p> <p>CIT di 2 settimane dopo un trattamento antibiotico e fino a guarigione completa, se intervento complicato.</p>
	Vedere anche	Ascesso
Depilazione elettrica	Rinvio	Agopuntura
Depressione	Misure	<p>Accettare se assunzione solamente di compresse e situazione medica stabile.</p> <p>CIT di 1 settimana dopo l'ultima assunzione del medicamento Litio (proprietà teratogena).</p>
Dermatite	Misure	Accettare se la lesione è poco estesa, il trattamento locale (topico) e il sito della puntura venosa per la donazione di sangue è sano.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Desensibilizzazione, allergia	Definizione	In caso di raffreddore da fieno, allergia a puntura di api, vespe.
	Misure	CIT durante le 48 ore che seguono l'ultima iniezione.
	Vedere anche	Allergie
Diabete insipido	Misure	CID.
Diabetes mellitus	Misure	Accettare se il diabete è controllato da trattamenti dietetici accompagnati o no da antidiabetici orali, in assenza di complicazioni e di segni d'infezione e in assenza di danni agli organi.
		Accettare in caso di terapia parenterale (eccetto insulina) se: <ul style="list-style-type: none"> • nessun segno di infezione o altre alterazioni cutanee nei siti di punzione • i criteri sopracitati sono soddisfatti • valutazione dell'attitudine alla donazione da parte del medico del STR al momento della prima donazione. CIT se il diabete è instabile o in caso di danni agli organi. CID se in trattamento con insulina.
Diarrea	Nota bene	Informarsi sulla frequenza e la durata dell'episodio diarroico (manifestazione isolata, cronica, febbre, ecc.).
	Misure	CIT di 2 settimane dopo guarigione completa e fine del trattamento medico (eccezione: infiammazione intestinale cronica).
	Vedere anche	Colon irritabile Crohn, morbo di Febbre tifoide Gastroenterite, contatto Rettocolite ulcero-emorragica Shigellosi
Differite	Misure	CIT di 1 mese fino a guarigione.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Distacco della retina (ablatio retinae)	Definizione	Distacco della retina dovuto a varie cause: le cause più comuni sono il diabete, l'ipertensione, la miopia e i traumi.
	Nota bene	Chiedere informazioni sulla malattia di base.
	Misure	CIT di 1 mese CIT di 1 mese dopo il completamento della terapia, compreso il trattamento laser.
Distrofia muscolare	Misure	CID.
Disturbo bipolare affettivo	Definizione	Malattia maniaco-depressiva.
	Nota bene	Chiarire sempre la condizione psicologica e la capacità di recupero.
	Misure	Accettare se stabile il giorno della donazione. CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione di farmaci con acido valproico o carbamazepina (teratogeni). Se non è possibile determinare uno stato stabile, l'idoneità della donatrice o del donatore deve essere valutata dal medico del STR.
Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)	Misure	Accettare anche donatori che assumono metilfenidato (p. es. Ritalin®).
Disturbo d'ansia	Rinvio	Disturbo di panico
Disturbo di panico	Definizione	Un disturbo d'ansia caratterizzato da diversi attacchi di panico al mese e legato a un disturbo dell'aspettativa ansiogena o un comportamento di evitamento associato con limitazioni nella vita quotidiana.
	Misure	Accettare se stabile il giorno della donazione. Se non è possibile determinare lo stato di stabilità, l'idoneità della donatrice o del donatore deve essere valutata dal medico del STR.
Diverticolite	Misure	CIT di 3 mesi dopo la fine del trattamento.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Diverticolosi	Misure	CIT se sintomatico.
Drepanocitosi	Rinvio	Anemia falciforme
Droga, consumo di	Nota bene	Un consumo di droga per via non parenterale, rilevato nell'anamnesi, non è di per sé una controindicazione; bisogna quindi analizzare l'affidabilità delle risposte date dal donatore, ben conoscendo l'incidenza particolarmente alta delle infezioni HIV, HBV, HCV nella popolazione in questione.
	Misure	CIT per i donatori sotto l'effetto di droghe anche se queste sono assunte "solo" per via orale. CID se consumo per via endovenosa.
	Vedere anche	Rapporti sessuali sotto effetto di droghe sintetiche; Chem-Sex Rapporti sessuali, partner intimi Situazioni a rischio
Dry Needling	Rinvio	Agopuntura
Duodenale, ulcera-	Misure	CIT se sintomatico e in caso di trattamento medico (somministrazione nel corso degli ultimi 3 mesi).
	Vedere anche	Gastrectomia
Dura-madre, operazione/trapianto	Rinvio	Creutzfeldt-Jakob, malattia di
Ebola	Rinvio	Febbre emorragica da virus
Echinococchi	Definizione	Malattia causata da un verme preso dalla volpe, dal cane o dal gatto. C: cisti epatiche, alveolite. T: vermifugo.
	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Eczema	Definizione	La dermatite atopica (spesso chiamata eczema) è un'inflammazione cronica e pruriginosa degli strati superiori della pelle e si manifesta spesso in persone che soffrono di raffreddore da fieno o asma o i cui familiari sono affetti da malattie allergiche.
	Misure	<p>Accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la superficie interessata è piccola e circoscritta e • il sito di punzione non è interessato e • nessun trattamento o trattamento solo locale. <p>CIT se aree cutanee aperte fino alla guarigione.</p> <p>CIT in caso di trattamento con corticosteroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia.</p>
Embolia polmonare	Misure	<p>Accettare dopo guarigione completa se embolia grassa post-traumatica.</p> <p>CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento anticoagulante, se</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della trombosi all'origine dell'embolia è chiaramente meccanica o dovuta ad immobilizzazione, • se si tratta di un solo episodio di trombosi senza recidive. <p>CIT in tutti altri casi.</p>
	Vedere anche	Trombosi, venosa profonda
Emicrania	Misure	<p>Accettare se al momento della donazione nessun episodio di cefalea.</p> <p>CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione di farmaci con topiramato (teratogeni).</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Emocromatosi	Definizione	Malattia ereditaria che porta all'accumulo eccessivo di ferro nel corpo.
	Misure	<p>Accettare solo se si ha predisposizione genetica senza sovraccarico di ferro.</p> <p>Accettare se è presente la mutazione genetica con diagnosi di emocromatosi ma senza coinvolgimento rilevante di organi (ad eccezione delle artropatie). Stato dopo salassoterapia e possibilmente ferritina non aumentata. La frequenza di donazione può essere di 6 volte all'anno per gli uomini e di 4 volte all'anno per le donne. L'intervallo di donazione di 10 settimane può essere ridotto.</p> <p>CID se esistono danni a organi (ad eccezione delle artropatie).</p>
Emofilia a e b	Definizione	Disturbo ereditario del processo di coagulazione del sangue dovuto alla mancanza o inattività del fattore risp. VIII e IX.
	Misure	<p>Accettare se statuto di "portatore di un tratto emofiliaco" (senza altri fattori di rischio).</p> <p>CID in tutti gli altri casi.</p>
	Vedere anche	Coagulazione, disturbi della Trasfusione di sangue
Emoglobina	Misure	<p>Accettare valori più bassi nei singoli casi se d'intesa con il medico del STR.</p> <p>Accettare per donazione di sangue completo se</p> <ul style="list-style-type: none"> • donne ≥ 125 g/l • uomini ≥ 135 g/l. <p>Accettare per aferesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • donne ≥ 110 g/l • uomini ≥ 120 g/l <p>CIT, se</p> <ul style="list-style-type: none"> • donne > 190 g/l • uomini > 200 g/l

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Emoglobinopatia	Definizione	Malattia dovuta a un'alterazione della formazione di emoglobina, per lo più dovuta a un difetto genetico. La rilevanza clinica varia a seconda dell'ereditarietà, della dominanza (eterozigosi, omozigosi) e della localizzazione del difetto.
	Vedere anche	Anemia falciforme Talassemia
Emorroidi	Misure	CIT se sanguinamenti regolari o abbondanti.
Emorroidi, cura chirurgica	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Encefalite	Misure	CIT fino a guarigione completa.
	Vedere anche	Encefalite da zecche
Encefalite da zecche	Misure	CIT fino a guarigione completa (assenza di sintomi per almeno 6 mesi dalla fine del trattamento).
Endometriosi	Misure	CIT se sintomatica. CIT di 2 mesi dopo l'ultima assunzione di farmaci a base di Leuprorelini acetat (teratogeni).
	Misure	CIT di 4 mesi dopo un'endoscopia con strumenti flessibili.
Endoscopia	Misure	CIT di 4 mesi dopo un'endoscopia con strumenti flessibili.
Enfisema	Misure	CIT.
Epatite A	Misure	CIT di 4 mesi.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Epatite B	Misure	<p>CIT di 4 mesi dopo aver soggiornato per 6 mesi o più in paesi con un alto tasso di HBV.</p> <p>CID se HBsAg e/o HBV NAT e/o anti-HBc positivo. Vedi cap. 21 / Allegato Art. 8.1 «Algoritmi per la diagnosi di HBV/ HCV/ HIV».</p> <p>I criteri secondo il Cap. 17D / Allegato Art. 7.3 "Vaccine Check - Controllo vaccinale" devono essere soddisfatti.</p>
	Vedere anche	<p>Epatite B, contatto domestico</p> <p>Epatite B, partner sessuale</p> <p>Epatite, attività a rischio, contatto</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>
Epatite B, contatto domestico	Definizione	Convivente
	Misure	<p>CIT del donatore fintanto che persiste un contatto domestico.</p> <p>CIT di 6 mesi se il donatore aveva un partner convivente con comprovata infezione da HBV, se da allora non vi è più stato alcun contatto, prelievo supplementare di sangue a scopo diagnostico (anti-HBc).</p>
	Vedere anche	<p>Epatite, attività a rischio, contatto</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>
Epatite B, partner sessuale	Misure	<p>CIT di 6 mesi se il donatore aveva un partner sessuale con comprovata infezione da HBV, se da allora non vi è stato più alcun contatto, prelievo supplementare di sangue a scopo diagnostico (anti-HBc).</p> <p>CID del donatore se persiste un contatto sessuale.</p>
	Vedere anche	<p>Epatite, attività a rischio, contatto</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>
Epatite C	Misure	<p>CIT di 4 mesi dopo aver soggiornato per 6 mesi o più in Paesi con un alto tasso di HCV.</p> <p>CID se presenza d'anticorpi e/o HCV-RNA positivo.</p>
	Vedere anche	<p>Epatite, attività a rischio, contatto</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Epatite C, partner	Misure	CIT di 6 mesi se il donatore aveva un partner sessuale con una comprovata infezione da HCV, se da allora non vi è più stato alcun contatto. CID del donatore se persiste un contatto sessuale.
	Vedere anche	Rapporti sessuali, partner intimi

Epatite E	Misure	CIT di 3 mesi
------------------	--------	---------------

Epatite invettiva (senza prova oggettiva)	Misure	CID ed informare il donatore in assenza di marcatori d'infezione evidenziabili, se in base alle donazioni di sangue per due pazienti diversi sussiste il forte dubbio di un'epatite trasmessa da trasfusione. Eventuale richiamo del plasma risp. Look-back.
--	--------	--

Epatite, Anamnesi poco chiara	Nota bene	Se anamnesi epatite poco chiara, solo prelievo di sangue a scopo diagnostico.
	Vedere anche	Epatite B Epatite C

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Epatite, attività a rischio, contatto	Misure	<p>Accettare il personale ospedaliero che cura pazienti con epatite e il personale di laboratorio, se un incidente da esposizione / inoculazione può essere escluso.</p> <p>CIT di 4 mesi dopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatuaggi; • Make-up semi permanenti; • Endoscopia con strumenti flessibili; • Contatto con sangue estraneo (contatto di sangue con la mucosa o ferita sulla pelle); <p>CIT di 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dopo l'ultimo contatto domestico stretto con il/la convivente con HBV. <p>CIT di 12 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le persone che hanno ricevuto immunoglobuline anti-epatite B dopo una ferita con materiale contaminato.
	Vedere anche	<p>Agopuntura</p> <p>Contatto con sangue estraneo</p> <p>Endoscopia</p> <p>Epatite B, contatto domestico</p> <p>Epatite B, partner sessuale</p> <p>Epatite C, partner</p> <p>Personale ospedaliero</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p> <p>Tatuaggi</p>
Epilessia	Nota bene	<p>Uno stress, anche se di poca importanza, può scatenare una crisi. È dunque importante evitare qualsiasi fattore di questo tipo.</p>
	Misure	<p>CIT se sotto trattamento anticomiziale a lungo termine.</p> <p>Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se questo è stato interrotto da 3 anni ma senza ricomparsa di crisi. In questo caso la donazione può essere accettata.</p>
Epistassi	Misure	<p>CIT se ricorrente e se si verifica un problema grave e regolare di anemia.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Erisipela	Misure	CIT di 1 mese dopo guarigione completa.
Eritema infettivo	Definizione	Malattia infettiva contagiosa causata da un Parvovirus con decorso spesso asintomatico; solo alcuni dei soggetti infetti presentano la caratteristica eruzione cutanea.
	Misure	CIT di 1 mese dopo la completa guarigione.
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto
Ernia del disco	Misure	Accettare senza operazione.
Ernia del disco, operazione	Misure	CIT da 6 a 12 mesi (dopo valutazione fatta del medico del STR) dopo l'intervento per allargamento del canale spinale/spondilodesi. CIT di 3 mesi dopo un intervento poco invasivo (emilaminectomia).
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Ernia iatale, operazione	Misure	CIT di 6 mesi dopo l'operazione in assenza di complicazioni.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Ernia inguinale, operazione	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a completa guarigione.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Eroina	Rinvio	Droga, consumo di
Esofagite	Rinvio	Gastrite

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Fattori della coagulazione, somministrazione	Vedere anche	Emofilia a e b Trasfusione di sangue
Febbre	Definizione	Febbre > 38° C
	Nota bene	Cercare di determinare la causa. Informarsi sui viaggi all'estero del donatore, in particolare in regioni tropicali.
	Misure	CIT di 2 settimane dopo la scomparsa dei sintomi.
Febbre emorragica da virus	Misure	CIT di 12 mesi dopo la guarigione da Lassa, Marburg, Congo/Crimea. CID dopo infezione da ebola pregressa
	Vedere anche	Dengue (Febbre rossa)
Febbre emorragica da virus, contatto	Misure	CIT di 1 mese dopo il rientro.
Febbre gialla	Definizione	Malattia causata da un virus inoculato da zanzare o zecche. C: complicazioni epato-renali possibili, con lesioni organiche
	Misure	CIT di 3 mesi fino a guarigione completa.
Febbre gialla, contatto	Misure	CIT di 1 mese dopo il contatto.
Febbre paratifoide	Rinvio	Febbre tifoide
Febbre q	Definizione	Malattia causata da un battere - coxiella burnetii - presente in molti animali come il manzo o la capra, espulso con le feci. T: AB
	Misure	CIT di 2 anni dopo guarigione.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Febbre ricorrente	Misure	CIT per due anni dopo la guarigione completa.
Febbre tifoide	Misure	CIT fino a guarigione completa e a distanza di almeno 2 settimane dalla fine del trattamento antibiotico.
Ferita	Misure	CIT fino a guarigione completa (assenza di segni di infiammazione cutanea).
	Vedere anche	Chirurgia traumatologica Personale ospedaliero
Fibrillazione atriale	Rinvio	Aritmia cardiaca
Fibroadenoma del seno, ablazione	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a completa guarigione.
	Vedere anche	Cancro Operazione / Intervento (in generale)
Fibromialgia	Rinvio	Autoimmune, malattia
Filariosi	Misure	CID.
Flebite	Rinvio	Trombosi, venosa superficiale
Foruncolo	Rinvio	Ascesso
Frattura	Misure	CIT fino a completa guarigione. CIT di 1 mese dopo la rimozione del gesso. CIT di 1 mese dopo la fine dell'anticoagulazione (sotto-cutanea) e/o l'allontanamento del gesso se trattamento conservativo (gesso circolare). CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali.
	Vedere anche	Impianto

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Frattura, osteosintesi	Misure	CIT di 1 mese dopo allontanamento del materiale d'osteosintesi. CIT di 3 mesi dopo osteosintesi.
	Vedere anche	Impianto Operazione / Intervento (in generale) Trasfusione di sangue
Fuoco di Sant'Antonio	Rinvio	Herpes zoster
G6PD, deficienza in –	Misure	CID.
Gastrectomia	Definizione	con/senza duodenectomia
	Misure	CIT di 6 mesi dopo gastrectomia parziale. CIT di 12 mesi se si è sottoposto a cura chirurgica di un'ulcera peptica.
	Vedere anche	Chirurgia viscerale Operazione / Intervento (in generale)
Gastrica, ulcera-	Misure	CIT di 3 mesi se guarigione completa.
	Vedere anche	Endoscopia Gastrectomia
Gastrite	Misure	Accettare se presenta solo una sintomatologia minore alleviata da una somministrazione regolare o episodica d'antiacidi o di inibitori della pompa protonica. CIT se gli antiacidi o gli inibitori della pompa protonica sono inefficaci. CIT di 1 mese dopo la scomparsa dei sintomi, se la malattia è in fase acuta.
Gastroenterite	Rinvio	Diarrea

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Gastroenterite, contatto	Misure	CIT di 1 settimana dopo contatto.
Gilbert, malattia di-	Definizione	e/o colemia familiare. Disturbo dell'assunzione di bilirubina nelle cellule epatiche, con aumento della sostanza nel sangue.
	Misure	CIT se ittero.
	Vedere anche	Ittero
Glaucoma	Definizione	Danno al nervo ottico dovuto all'aumento della pressione nell'occhio.
	Misure	Accettare se il trattamento è locale (gocce oftalmiche) o se il trattamento è con betabloccanti, dopo un controllo del polso (> 60) e della pressione arteriosa (> 120/60 mm Hg). CIT fino alla fine da tutti gli altri trattamenti.
	Vedere anche	Glaucoma, operazione
Glaucoma, operazione	Misure	CIT di 1 mese fino a completa guarigione.
	Vedere anche	Chirurgia oftalmologica Operazione / Intervento (in generale)
Glomerulonefrite	Misure	CIT di 12 mesi dopo guarigione completa.
Gonorrea	Definizione	Malattia sessualmente trasmissibile provocata da un battere (gonococco).
	Misure	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento del donatore e dell'eventuale partner sessuale.
Gotta	Misure	Accettare se in forma minore, eventualmente trattata con Allopurinolo (ad es. Zyloric®). CIT di 2 settimane dopo scomparsa dei sintomi d'una crisi acuta.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Gozzo (struma)	Rinvio	Iperiparoidismo
Gravidanza	Misure	CIT durante la gravidanza e fino ad 12 mesi dopo il parto.
	Vedere anche	Interruzione di gravidanza
Gravidanza, desiderio di	Misure	Accettare CIT di 6 mesi dopo l'ultima assunzione di Clomid/ Clomifen® (proprietà teratogena).
Guillain-Barré, sindrome di	Definizione	Malattia neurologica che porta alla paralisi temporanea delle gambe e di altre parti del corpo.
	Misure	CIT di 2 anni dopo guarigione completa senza conseguenze in un anno e in assenza di recidiva (conferma della diagnosi da parte del medico curante).
Hashish	Rinvio	Cannabis (canapa indiana)
Herpes genitale	Misure	CIT fino a guarigione delle lesioni e 2 settimane dopo la fine del trattamento, se l'anamnesi non rivela alcun'altra malattia sessualmente trasmissibile (ad es. Clamidia). CIT di 2 settimane dopo l'ultimo rapporto sessuale o guarigione delle lesioni del partner regolare.
Herpes labiale	Definizione	«Febbre delle labbra». Manifestazione più frequente di un'infezione con il virus Herpes simplex con formazione di vescicole sulle labbra.
	Misure	CIT fino alla guarigione delle lesioni.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Herpes zoster	Definizione	Malattia virale provocata dal virus Varicella zoster (appartenente alla famiglia degli Herpes virus). Riattivazione endogena di una precedente infezione iniziale (per lo più varicella nell'infanzia).
	Misure	CIT di 1 mese dopo completa guarigione (essiccazione delle lesioni).
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto
HIV	Misure	<p>CIT di 4 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> dopo aver soggiornato per 6 mesi o più in paesi con un alto tasso di HIV. <p>CID se:</p> <ul style="list-style-type: none"> infezione da HIV confermata; Iniezione di droghe (in passato o nel presente). <p>Rinvio "Foglio informativo per i donatori di sangue".</p> <p>Rinvio Capitolo 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
	Vedere anche	<p>Prostituzione, Sexworker</p> <p>Rapporti sessuali sotto effetto di droghe sintetiche; Chem-Sex</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>
HIV Partner intimo	Misure	<p>CIT di 12 mesi dall'ultimo contatto sessuale con un partner con un'infezione confermata da HIV.</p> <p>CID del donatore con contatto continuo.</p>
HTLV I/II	Definizione	Virus T-linfotropico dell'uomo I/II
	Misure	CID.
Ictus	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Ileostomia	Misure	CID.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Immunobioterapia	Misure	<p>Accettare in caso di preparati batterici (per es. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccaline®, Luivac®, Ribomunyl®), se non sussistono malattie croniche sottostanti o infezioni ricidive.</p> <p>CIT di 12 mesi dopo la fine dell'immunoterapia originata da tessuti umani (per es. Cytotect®, Hepatect®, vaccinazione passiva contro la rabbia ed il tetano, Varitect®).</p> <p>Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione in caso di immunoterapia di origine umana/bovina (per es. Solcoceryl®).</p>
Impianto	Misure	<p>Sono ammessi impianti dentali quali Cerabone®, Bio-Oss®, Bio-Oss Collagen® e Bio-Gide®.</p> <p>Per gli altri impianti non elencati per la cui fabbricazione sono impiegati tessuti o cellule di origine umana o animale oppure loro derivati, l'attitudine alla donazione è concessa soltanto se il certificato CE e la dichiarazione CE di conformità dell'impianto, sono stati rilasciati secondo il nuovo regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.</p> <p>Gli impianti con certificato CE rilasciato secondo la vigente direttiva relativa ai dispositivi medici 93/42/CEE (MDD) possono essere ammessi su valutazione del servizio medico, se il fabbricante conferma per iscritto al STR che in base all'origine della materia prima e alla procedura di fabbricazione di questi dispositivi, è garantita l'assenza di agenti patogeni (incl. virus e prioni) di malattie infettive.</p> <p>I certificati CE devono essere verificati al minimo, quanto alla correttezza, sui seguenti punti: direttiva/regolamento, durata di validità/data di scadenza del certificato, nome del fabbricante e designazione del dispositivo.</p>
	Vedere anche	Dentario, trattamento
Implanon®	Misure	CIT per 72 ore (in assenza di irritazioni cutanee).
Infarto del miocardio	Misure	CID.
Infiammazione del fegato, infettivo	Rinvio	Epatite, Anamnesi poco chiara

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Infiammazione della cornea	Rinvio	Cheratite (infiammazione della cornea)
Influenza	Misure	CIT di 2 settimane fino a guarigione.
Influenza, contatto	Misure	CIT di 2 settimane dopo contatto con una persona malata.
Inoculazione, lesione da	Rinvio	Contatto con sangue estraneo
Insufficienza cardiaca	Definizione	Insufficienza cardiaca, che comporta una riduzione dell'apporto di ossigeno.
	Misure	CID.
Insufficienza renale cronica	Misure	CID.
Insufficienza surrenalica	Misure	CID anche in caso di sostituzione.
Insulto ischemico transitorio (tia)	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Insulto vascolare cerebrale (ivc)	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Interruzione di gravidanza	Nota bene	Ricerca degli anticorpi irregolari antieritrocitari.
	Misure	CIT per un periodo equivalente a quello della gravidanza alla data dell'interruzione (gravidanze di meno di 28 settimane). CIT di 12 mesi in caso di interruzione nel corso del terzo trimestre (> 28 settimane).
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Intolleranza alimentare	Definizione	L'intolleranza alimentare è una reazione allergica a un determinato alimento.
	Misure	Rinvio a Allergie.
Intossicazione alimentare	Rinvio	Diarrea
Ipercolesterolemia	Misure	Accettare anche con trattamento. Accettare se non associato a malattie cardiache e cardiovascolari o ad altre malattie sintomatiche.
	Vedere anche	Malattie cardiovascolari
Ipertensione arteriosa	Misure	CIT se con betabloccanti polso < 60/min e/o PA sistolica < 120 mm Hg. CIT se la PA sistolica è > 180 mm Hg o la diastolica > 100 mm Hg. CIT se dopo l'inizio o il cambiamento della terapia con antipertensivi o cambiamento di medicamento fino a quando la PA è stabilizzata.
	Vedere anche	Bradycardia
Ipertensione arteriosa polmonare	Misure	CID.
Ipertireosi	Rinvio	Ipertiroidismo
Ipertiroidismo	Misure	CIT di 6 mesi dopo una tiroidectomia o un trattamento con iodio radioattivo. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se trattamento con tireostatici (ad es. Neo-mercazole®).
	Vedere anche	Tiroidite autoimmune

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Ipotensione arteriosa	Nota bene	L'Effortil® non può essere somministrato prima la donazione.
	Misure	<p>CIT se la pressione sistolica < 100 mm Hg e la pressione diastolica < 50 mm Hg.</p> <p>Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se pressione sistolica < 120 mm Hg in un iperteso trattato e/o se vertigine d'origine indeterminata.</p>
Ipotireosi	Rinvio	Ipotiroidismo
Ipotiroidismo	Nota bene	Informarsi su eventuali complicazioni (per es. angina pectoris).
	Misure	Accettare se ben stabilizzato e asintomatico con il trattamento di sostituzione.
	Vedere anche	Tiroidite autoimmune
Isterectomia	Misure	CIT di 1 mese a 3 mesi se patologia benigna, in funzione della natura dell'intervento e delle eventuali complicazioni, dopo valutazione del medico di STR.
	Vedere anche	<p>Cancro</p> <p>Operazione / Intervento (in generale)</p>
Itterizia	Rinvio	Ittero
Ittero	Misure	Accettare se antecedenti di emolisi neonatale, colelitiasi, ittero congenito non infettivo (Malattia di Gilbert) o altre cause documentate, non infettive o cancerogene (tossiche, medicamentose).
	Vedere anche	<p>Cistifellea, calcolosi della</p> <p>Epatite, Anamnesi poco chiara</p> <p>Gilbert, malattia di-</p>
Ittero intermittente giovanile	Rinvio	Gilbert, malattia di-

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Kala-azar	Misure	CID.
Lambiasi	Definizione	<p>Malattia causata da un protozoo, giardia lamblia, parassita dell'intestino.</p> <p>Contagio con elementi come cibo e acqua contaminati, in mancanza di igiene.</p> <p>C: diarrea, vomito, febbre.</p> <p>T: AB.</p>
	Misure	<p>CIT di 24 ore dopo la guarigione e la fine della somministrazione di ogni medicamento distribuito senza ricetta.</p> <p>CIT di 2 settimane dopo una terapia antibiotica.</p>
Laminectomia	Misure	CIT durante almeno 6 mesi.
	Vedere anche	<p>Ernia del disco, operazione</p> <p>Operazione / Intervento (in generale)</p>
Laringite	Rinvio	Tonsillite
Legamento, rottura di un	Misure	<p>Accettare eccetto in caso di operazione meno di un mese prima.</p> <p>Se dubbi, consultare il medico del STR.</p>
	Vedere anche	<p>Chirurgia ortopedica</p> <p>Operazione / Intervento (in generale)</p>
Legatura delle ovaie	Rinvio	Sterilizzazione tubarica
Legionella, malattia da-	Definizione	<p>Battere presente in acqua a temperatura di 20°C – 25°C, p. es. impianti di ventilazione, saune.</p> <p>C: polmonite.</p> <p>T: AB</p>
	Misure	CIT fino a completa guarigione.
Leishmaniosi	Rinvio	Kala-azar

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Leptospirosi	Definizione	Malattia causata da batteri, spirochete, inoculati attraverso microlesioni alle mani dopo contatto con urina infetta di maiale e altri animali. C: vascolite, aumentato rischio di emorragie, diminuzione dell'apporto di O2 ai tessuti, ittero e disturbo della funzione renale. T: AB.
	Misure	CIT fino a completa guarigione.
Lesione cranica	Rinvio	Trauma cranico (SDH)
Lesione cutanee	Vedere anche	Contatto con sangue estraneo Ferita Piercing Tatuaggi
Lichen scleroso	Rinvio	Eczema
Linfangite	Misure	CID se affezione maligna.
	Vedere anche	Erisipela
Linfogranuloma venereo	Definizione	Lesione causata da un battere, Chlamidia tracomatis, trasmesso tramite rapporti sessuali. C: ulcera e conseguente linfadenite. T: AB
	Misure	CIT temporanea fino alla prova medica della riuscita del trattamento.
Lupus eritematoso disseminato (led)	Definizione	Malattia sistemica della pelle e del tessuto connettivo dei vasi, legata al deposito di complessi immuni.
	Misure	CID.
Lussazione articolare	Misure	CIT di 1 settimana dopo l'incidente.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Lyme, malattia di	Definizione	<p>Malattia data da un battere, <i>Borrelia burgdorferi</i>, trasmessa tramite puntura di zecche.</p> <p>C: meningoradicolite oltre ad altre manifestazioni.</p> <p>T: AB.</p>
	Misure	<p>Accettare se test agli anticorpi positivo in assenza di sintomi.</p> <p>CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento e guarigione completa.</p> <p>CID se sintomatologia cronica.</p>
Mal di gola	Rinvio	Tonsillite
Malaria / regioni endemiche	Nota bene	<p>I donatori seguenti potranno essere riammessi soltanto se un test per la malaria (IF o ELISA) effettuato almeno 4 mesi dopo il ritorno è negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di una febbre inesplicabile o di altri sintomi di malattia durante o dopo il soggiorno; • In caso di anamnesi positiva di malaria; • Durante un soggiorno di più di 6 mesi in una regione dove la malaria è endemica.
	Misure	<p>CIT di 4 mesi dopo il ritorno da una regione endemica, se un test di laboratorio per la malaria (IF o ELISA) dà un risultato negativo.</p> <p>CIT per un periodo di 6 mesi almeno, dopo il ritorno da una regione endemica, in assenza di test per la malaria.</p> <p>Se il risultato è positivo vale una CIT di 3 anni. Dopo la scadenza di questo termine si potrà effettuare un altro test. CID se il test è nuovamente positivo. CID, se non viene effettuato alcun test di laboratorio. Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
Malaria, profilassi	Misure	Accettare se iniziata, prima del viaggio.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Malattia cerebrovascolare	Misure	CID in caso di ictus/attacco apoplettico, status post Stent/laser, ostruzione vascolare periferica, aneurismi vascolari, qualora conseguente ipoperfusione cerebrale, in particolare in caso di manifestazioni di paralisi: emiplegia (insulto vascolare cerebrale), insulto ischemico transitorio (tia)
	Vedere anche	Sordità improvvisa neurologica
Malattia del sonno	Rinvio	Tripanosomiasi africana
Malattia di Horton	Rinvio	Arterite temporale
Malattia ematologia maligna	Rinvio	Cancro
Malattia, occhi	Misure	CIT di 2 settimane dopo le infiammazioni. CIT di 1 mese dopo le operazioni.
	Vedere anche	Calazio Cataratta Cheratite (infiammazione della cornea) Congiuntivite allergica Congiuntivite infettiva Degenerazione maculare (AMD) Distacco della retina (ablatio retinae) Glaucoma Orzaiolo Retinite pigmentosa Trombosi dell'arteria oftalmica Trombosi oftalmica Uveitis

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Malattie cardiovascolari	Misure	<p>Accettare se difetto cardiaco congenito asintomatico, ad esempio operato senza complicazioni e senza antibioterapia profilattica.</p> <p>Accettare se prolasso della mitrale.</p> <p>CID se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cardiopatia coronarica (CHD) • angor/angina pectoris • infarto, disturbi del ritmo d'origine organica (con o senza posa di pacemaker) • fibrillazione atriale • intervento cardiaco (bypass) • pazienti sotto terapia antibiotica profilattica • status dopo Stent/laser • stenosi aortica, stenosi arteriose • claudicazione intermittente • aneurisma • stenosi della valvola mitrale (malattia reumatica) • ipertensione polmonare • insufficienza cardiaca.
	Vedere anche	Trapianto

Malattie cutanee	Misure	<p>Accettare se l'espressione cutanea di una malattia costituzionale (Neurodermatite, Psoriasi, Eczema, ecc) in assenza di lesioni sulla piega del gomito e di trattamento potenzialmente teratogeno.</p> <p>CIT dipendente dalla causa se generalizzata.</p>
	Vedere anche	<p>Eczema</p> <p>Ferita</p> <p>Lyme, malattia di</p> <p>Psoriasi</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Malattie del tratto digestivo	Misure	CID se malattia immunologica (ad es. morbo di Crohn, colite ulcerosa) o suscettibile di portare a una carenza di ferro (disturbi dell'assorbimento del ferro o sanguinamento).
	Vedere anche	Diarrea

Malattie del tratto respiratorio	Misure	Accettare se affezione polmonare cronica (BPCO) non scompensata (assenza di superinfezione, di asma, di poliglobulia). CID se affezione grave e/o cronica che necessita di una terapia con steroidi a lungo termine. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se affezione acuta.
---	--------	---

Malattie infettive, contatto	Misure	Accettare se vaccinazione o immunizzazione precedente (anamnesi). CIT di 1 mese dopo il contatto (o se il tempo di incubazione è sconosciuto). Rinvio al criterio specifico se presente.
	Vedere anche	Contatto con sangue estraneo

Malattie, psichiatriche	Vedere anche	Depressione Disturbo bipolare affettivo Disturbo di panico Psicosi non acuta Psicosi, acuta Schizofrenia
--------------------------------	--------------	---

Mantoux, test di-	Misure	CIT fino alla fine delle indagini e per almeno una settimana dopo l'iniezione di tubercolina.
	Vedere anche	Tubercolosi

Marfan, sindrome di-	Misure	CID
-----------------------------	--------	-----

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Mastocitosi	Definizione	La mastocitosi è una malattia rara che comporta un accumulo inusuale ed eccessivo di mastociti nella pelle e occasionalmente in altre parti del corpo. Si distingue dalle tipiche reazioni allergiche perché tende a essere più cronica che episodica.
	Misure	CID.
Mastoide, operazione al-	Misure	CIT fino a guarigione completa e di 2 settimane dopo la fine della terapia antibiotica.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Mastoidite	Misure	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico.
Medicamento	Rinvio	Medicamentoso, trattamento-
Medicamentoso, trattamento-	Misure	<p>Le considerazioni di base su come procedere in caso di trattamento medicamentoso sono contenute nel capitolo 17F / Allegato Art. 7.1 insieme a un elenco di medicinali di uso frequente.</p> <p>Nel capitolo 17F / Allegato Art. 7.1 sono riportate solo determinate categorie di medicinali che richiedono un CIT a causa dell'assunzione del farmaco stesso, come in caso di medicinali teratogeni o che influenzano la qualità del sangue (p. es. farmaci antiaggreganti piastrinici).</p> <p>In tutti gli altri casi la misura va determinata a seconda della malattia.</p> <p>In caso di dubbi, consultare il medico del STR.</p>
	Vedere anche	Medicina naturale
Medicina alternativa	Rinvio	Medicina naturale

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Medicina naturale	Nota bene	I trattamenti omeopatici o i medicinali di origine naturale non sono delle controindicazioni alla donazione di sangue. La controindicazione eventuale dipende dal modo di somministrazione (iv/sc, trattamento sanguigno per via extracorporea), dall'origine dei medicinali (umana /animale), così come dalla malattia sottostante.
	Misure	Accettare se trattamento omeopatico.
	Vedere anche	Agopuntura
Menière, malattia di-	Rinvio	Vertigini
Meningite	Nota bene	Verificare l'assenza di crisi comiziale antecedente.
	Misure	CIT di 3 mesi fino a completa guarigione.
Meningoencefalite	Rinvio	Encefalite da zecche
Menisco, operazione	Rinvio	Chirurgia ortopedica
Mestruazioni	Misure	Accettare durante le mestruazioni se il tasso d'emoglobina è normale. CIT in caso di ritardo delle mestruazioni che fanno sospettare un inizio di gravidanza.
Mezzi di contrasto	Nota bene	Informarsi sull'indicazione e il risultato dell'esame per escludere una malattia sottostante come controindicazione.
	Misure	CIT di 1 settimana dopo l'esame con mezzo di contrasto.
Micosi	Misure	Accettare se topici. CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento di micosi superficiale e guarigione completa CID se micosi profonda.
Microblading	Misure	CIT di 4 mesi

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Minkowski-Chauffard, malattia di-	Rinvio	Sferocitosi ereditaria
Miomectomia	Misure	CIT di 1 mese dopo l'operazione e fino a completa guarigione.
	Vedere anche	Cancro Operazione / Intervento (in generale)
Mixedema	Definizione	Forma di edema particolare, presente nelle patologie tiroidee.
	Misure	CIT se la malattia non è stabilizzata tramite il trattamento.
	Vedere anche	Ipotiroidismo
Mononucleosi infettiva	Misure	CIT di 6 mesi dopo la guarigione completa.
Morbillo	Definizione	Malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini. Virus a RNA della famiglia dei Paramyxoviridae.
	Misure	CIT di 1 mese dopo la completa guarigione.
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto
Morbo celiaco	Rinvio	Celiachia
Morsicatura di animale selvaggio o domestico	Misure	CIT fino a guarigione completa e di 2 settimane se trattamento con antibiotici. La rabbia è stata estirpata in Svizzera e nei paesi limitrofi. Considerare rischio potenziale in zona endemica. Se dubbio, CIT di 12 mesi.
	Vedere anche	Vaccinazione
Morsicatura umana	Misure	CIT di 4 mesi.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Mughetto	Misure	<p>Accettare solo se il trattamento è locale (vulvovaginite/balanite micotica) e in assenza di una patologia soggiacente.</p> <p>CIT fino a completa guarigione se altra localizzazione.</p>
Narcosi	Nota bene	Una narcosi non deve essere considerata a priori come una causa di esclusione
	Misure	<p>CIT dipendente dalla natura dell'intervento e dallo stato di salute del donatore: per esempio bisogna escludere il donatore dopo un intervento per tumore maligno, rinviarlo se in trattamento postoperatorio o se le cure ambulatoriali non sono terminate.</p> <p>Se dubbi, consultare il medico del STR.</p>
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Nefrectomia	Rinvio	Operazione / Intervento (in generale)
Nefrite	Misure	<p>CIT di 5 anni fino a ristabilimento completo della funzione renale se nefrite acuta.</p> <p>CID se nefrite cronica.</p>
Nematodi	Misure	CIT fino alla fine del trattamento.
	Vedere anche	<p>Bilartziosi</p> <p>Echinococcosi</p> <p>Filariosi</p>
Neurofibromatosi	Definizione	Malattia ereditaria con formazione di neurofibromi, tumori benigni di origine neurale, in tutto il corpo.
	Misure	CID in caso di degenerazione maligna che necessita un trattamento.
	Vedere anche	Cancro
Neurolettici	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Nicotina, disassuefazione da

Misure

Accettare

Obesità, terapia parenterale

Misure

Accettare se:

- nessun problema circolatorio
- nessun segno di infezione o di altre alterazioni cutanee nei siti di punzione.
- iniettare secondo le istruzioni di uno specialista

Vedere anche

Diabetes mellitus

Occhio secco (sindrome di Sicca)

Definizione

Secchezza oculare dovuta a varie cause.

Misure

Accettare anche durante la terapia con colliri a base di siero autologo.

CID, se è presente una malattia autoimmune sistemica.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Operazione / Intervento (in generale)	Misure	CIT :
		<ul style="list-style-type: none"> • fino a guarigione completa (e la fine di un trattamento post-operatorio); • calcolare 2 settimane supplementari dopo la fine di un trattamento antibiotico; • calcolare 1 mese supplementare dopo la fine di un trattamento anticoagulante (sotto-cutaneo); • calcolare 3 mesi supplementari dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali; • di 1 mese dopo un intervento minore senza complicazioni; • di 4 mesi dopo un intervento in Paesi con alto tasso di HIV, HBV e HCV; • da 6 a 12 mesi dopo un intervento maggiore (dopo valutazione fatta dal medico del STR). <p>CIT durante i 2 mesi precedenti un intervento chirurgico programmato salvo trattarsi di interventi minori (ad es. sterilizzazione, escissione di una verruca ecc).</p> <p>CID:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se sussiste un rischio in relazione ad una infezione da prioni (ad es. trasfusione di sangue dopo il 1980, trapianto di cornea, di dura madre); • dopo trapianto (eccetto trapianto autologo). <p>In caso di malattia maligna prendere le stesse misure che per il criterio "cancro".</p>
	Vedere anche	Cancro Colostomia Creutzfeldt-Jakob, malattia di Endoscopia Impianto Narcosi Trapianto Trasfusione di sangue
Operazione alle palpebre	Rinvio	Chirurgia oftalmologica

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Orecchioni	Definizione	Parotite epidemica, "orecchioni". Malattia virale infettiva che colpisce le ghiandole salivari e altri organi.
	Misure	CIT di 1 mese dopo la completa guarigione
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto
Ormonale, trattamento	Misure	Accettare le donatrici che ricevono un trattamento di sostituzione ormonale a causa di disturbi legati alla menopausa o come trattamento preventivo dell'osteoporosi. CID dopo trattamento con gonadotropine (utilizzate nella cura della sterilità) di origine umana.
Orticaria	Definizione	L'orticaria è caratterizzata da lesioni in rilievo causate da un gonfiore localizzato. L'orticaria provoca prurito e arrossamento. Si verifica spesso nel contesto di reazioni di ipersensibilità a farmaci, punture o morsi di insetti, malattie autoimmuni e, più raramente, a fattori fisici come temperatura, pressione e luce solare. Di solito rimane < 24 ore.
	Misure	CIT se l'orticaria è generalizzata, fino alla completa guarigione.
Orzaiolo	Definizione	Infiammazione infettiva e dolorosa della palpebra, solitamente di origine batterica.
	Misure	CIT di 2 settimane dopo la completa guarigione e il completamento della terapia
Osteomielite	Misure	CIT fino a 2 anni dopo la completa guarigione e la fine dell' antibioticoterapia.
Otalgia / Otite	Misure	CIT fino alla guarigione completa e 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico.
Pacemaker	Misure	CID.
Paludismo	Rinvio	Malaria / regioni endemiche

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Pancreatite	Misure	CIT di 3 mesi dopo una crisi, in assenza di sintomi.
Paralisi facciale	Misure	CIT di 1 mese dopo guarigione completa, se la causa è infettiva (Herpes, altre infezioni batteriche o virali) e/o trattamento con steroidi.
Parkinson	Misure	CID.
Partner intimo	Rinvio	Rapporti sessuali, partner intimi
Pelle, cancro della	Rinvio	Cancro
Pemphigus	Misure	CIT fino a completa guarigione. CID se patologia autoimmune sistemica.
Peptica, ulcera-	Rinvio	Gastrica, ulcera-
Pericardite virale	Misure	CIT fino a completa guarigione.
Peritonite	Misure	CIT fino a completa guarigione e 2 settimane dopo l'antibiototerapia. Se processo maligno, prendere le stesse misure che per il criterio "cancro".
	Vedere anche	Cancro
Personale ospedaliero	Misure	CIT per una persona che si è ferita con uno strumento tagliente che è stato utilizzato con un paziente infetto (o sospettato d'esserlo) o se il sangue di questo paziente è entrato in contatto con una lesione cutanea (sia che si tratti del personale di laboratorio o di personale che si occupa di pazienti con epatite o SIDA).
	Vedere anche	Contatto con sangue estraneo
Pertosse	Misure	CIT di 1 mese dopo guarigione completa.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Peso	Misure	CID se < 50 Kg.
Piaga	Misure	CIT se piaga aperta o complessa. CIT di 2 settimane dopo l'allontanamento dei punti di sutura in assenza di segni di infezione.
Piccolo male	Rinvio	Epilessia
Pielite / pielonefrite	Misure	CIT fino a guarigione completa e per 2 settimane al minimo dopo sospensione della terapia antibiotica, se si tratta di una infezione acuta. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se trattasi di una infezione recidivante.
Piercing	Misure	CIT di 4 mesi.
Pleurite	Misure	CIT fino a guarigione completa e 2 settimane dopo la fine dell'antibiototerapia. CID se processo maligno.
Pneumotorace	Definizione	Aria nella cavità toracica, tra le due pleure.
	Misure	CIT fino a guarigione completa della lesione se pneumotorace traumatico o spontaneo. CID se complicazione di un enfisema.
Poliartrite	Rinvio	Artrite
Policitemia vera	Definizione	Malattia mieloproliferativa, con proliferazione autonoma soprattutto degli eritrociti. C: Arrossamento del viso, prurito, giramenti e mal di testa, ecc.
	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Poliomielite	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione
Poliplectomia colica	Misure	CIT di 4 mesi in funzione dell'intervento e delle eventuali complicazioni. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione sulla base dei risultati istologici.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Poliposi colica	Misure	CIT se sintomatico. CID se poliposi familiare.
Politrauma	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale) Trasfusione di sangue
Polmonite	Misure	CIT di minimo 6 settimane e almeno 2 settimane dopo la fine dell'antibioticoterapia. CID se processo maligno.
Porpora trombocitopenica idiopatica (itp)	Definizione	Diminuzione senza causa nota del numero di trombociti, con rischio di sanguinamenti più o meno grandi.
	Misure	Accettare se in remissione da almeno 12 mesi senza medicinali e con un conteggio dei trombociti normale. Accettare se anamnesi di ITP nell'infanzia. CID negli altri casi.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale) Trasfusione di sangue

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Proctite	Definizione	Inflammatione dell'ano.
	Misure	CIT se in trattamento.
	Vedere anche	Crohn, morbo di Rettocolite ulcero-emorragica
Profilassi post-esposizione (PEP) e profilassi pre-esposizione (PrEP)	Misure	CIT di 4 mesi dopo la fine del trattamento PEP / PrEP.
Prolasso uterino, operazione	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a completa guarigione.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Prostata, iperplasia della	Misure	CIT di 4 settimane dopo la fine della terapia con finasteride o Proscar®. CIT di 6 mesi dopo la fine della terapia con dutasteride (Avodart®) o dutasteride/tamsulosina (Duodart®). L'assunzione della tamsulosina da sola è ammessa (ad es. Pradif®, Tamsulosin T-Mepha® retard).
Prostatectomia	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento se affezione benigna e fino a completa guarigione. Se maligna, prendere le stesse misure che per il criterio "cancro".
	Vedere anche	Cancro Operazione / Intervento (in generale)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Prostituzione, Sexworker	Definizione	Sexworker sono persone che hanno contatti sessuali in cambio di denaro, droga o farmaci.
	Misure	<p>CIT di 12 mesi per i sexworker.</p> <p>CIT di 12 mesi dopo il contatto sessuale con un sexworker. Questo periodo può essere ridotto a 4 mesi, a condizione che il/la sexworker abbia cessato completamente la sua attività da almeno 12 mesi.</p> <p>CID per i sexworker che hanno avuto contatti in cambio di droghe per iniezione.</p> <p>Rinvio "Foglio informativo per i donatori di sangue".</p>
Protesi totale dell'anca / del ginocchio	Misure	CIT da 6 a 12 mesi dopo l'intervento (dopo valutazione fatta dal medico del STR).
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Provenienza da paesi con un alto tasso di HIV, HBV, HCV	Misure	<p>CIT di 4 mesi dopo l'arrivo in Svizzera.</p> <p>Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
Psicosi non acuta	Definizione	La psicosi si riferisce a un gruppo di disturbi mentali gravi che sono associati a un'estesa perdita temporanea di riferimenti alla realtà.
	Nota bene	<p>Occorre almeno una valutazione della malattia di base da parte del medico del STR.</p> <p>Occorre tenere conto della polimedicazione e dell'ospedalizzazione.</p>
	Misure	<p>Accettare se stabile il giorno della donazione.</p> <p>Se non è chiaro se sia acuto o meno, l'idoneità alla donazione deve essere valutata dal medico del STR.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Psicosi, acuta	Definizione	La psicosi si riferisce a un gruppo di disturbi mentali gravi che sono associati a un'estesa perdita temporanea di riferimenti alla realtà.
	Nota bene	<p>Occorre almeno una valutazione della malattia di base da parte del medico del STR.</p> <p>Occorre tenere conto della polimedicazione e dell'ospedalizzazione.</p>
	Misure	<p>CIT fino alla scomparsa dei sintomi.</p> <p>Se non è chiaro se sia acuto o meno, l'idoneità alla donazione deve essere valutata dal medico del STR.</p>
Psoriasi	Misure	<p>Accettare se forma lieve, che non tocca il sito di accesso venoso e non ha trattamento sistemico.</p> <p>CIT di 12 mesi dopo la fine della terapia con metotrexato.</p> <p>CIT di 3 anni dopo la fine della terapia con acitretina (Neotigason®).</p> <p>CID se forma grave generalizzata.</p>
Puntura	Rinvio	Ago, ferite da
Raffreddore	Misure	<p>CIT fino a guarigione completa.</p> <p>CIT di 2 settimane dopo la scomparsa di febbre > 38° C.</p>
	Vedere anche	Febbre
Raffreddore da fieno	Definizione	Allergia stagionale ai pollini che colpisce principalmente la congiuntiva dell'occhio e la mucosa nasale.
	Misure	Rinvio a Allergie
Rapporti sessuali sotto effetto di droghe sintetiche; Chem-Sex	Misure	CIT di 12 mesi dopo aver praticato chem-sex.
	Vedere anche	<p>Droga, consumo di</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>



**Rapporti sessuali,
partner intimi**

Misure

CIT di 4 mesi dopo:

- Contatto sessuale con un nuovo o una nuova partner. Per "nuovo o nuova partner" si intende:

- una persona con la quale la donatrice o il donatore non aveva ancora avuto un contatto sessuale OPPURE

- una persona con la quale la donatrice o il donatore ha avuto una relazione sessuale che si è conclusa e con la quale ha ripreso nuovamente un contatto sessuale negli ultimi 4 mesi.

- Rientro del partner sessuale che si è recato in paesi con un elevato tasso di HBV, HCV, HIV per 6 mesi o più o che sul luogo hanno ricevuto trasfusioni di sangue;
- ultimo contatto sessuale con partner che si è iniettato droghe (attualmente).

CIT di 6 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale:

- Con partner con epatite B o C.

CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale:

- Con cambio di partner negli ultimi 4 mesi (più di 2 partner);
- Con partner che risultano positivi all'HIV o alla sifilide;
- Con partner che ha avuto contatti sessuali con più di 2 persone negli ultimi 4 mesi;
- Con i sexworker. Questo periodo può anche essere ridotto a 4 mesi a condizione che i sexworker abbiano completamente smesso la loro attività da almeno 12 mesi;

Rinvio Capitolo 17 E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.

Rinvio "Foglio informativo per le donatrici e i donatori di sangue".

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

	Vedere anche	Clamidia, infezione Epatite B Epatite B, partner sessuale Epatite C Epatite C, partner Gonorrea HIV Linfogramuloma venereo Prostituzione, Sexworker Rapporti sessuali sotto effetto di droghe sintetiche; Chem-Sex Sifilide Sifilide, partner sessuale
Raschiamento	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento se nessuna patologia benigna.
	Vedere anche	Cancro Interruzione di gravidanza Operazione / Intervento (in generale)
Raynaud, sindrome di-	Definizione	Ischemia improvvisa e occasionale delle dita causata da freddo o emozioni.
	Misure	CIT se sintomatico. CID se associato a una malattia sottostante.
Recklinghausen, malattia di-	Rinvio	Neurofibromatosi
Retinite pigmentosa	Definizione	Morte delle cellule della retina, solitamente genetica.
	Misure	CID dopo la conferma della diagnosi da parte del medico curante o da un oftalmologo se ci sono i sintomi della malattia di Refsum.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Rettocolite ulcero-emorragica	Misure	CID.
Reumatismo articolare acuto	Misure	CIT di 2 anni dopo una crisi isolata senza complicazioni valvolari. CID se crisi recidivanti e/o prescrizione di un trattamento antibiotico a lungo termine.
Rickettsiosi	Misure	CIT di 2 settimane, CIT fino a guarigione completa e 2 settimane della fine del trattamento antibiotico.
Riduzione di peso, operatoria	Rinvio	Chirurgia viscerale
Rimozione del tumore all'occhio	Nota bene	Tutte le aperture delle meningi richiedono l'esclusione.
	Misure	Rinvio a Chirurgia oftalmologica
Rinite	Misure	CIT fino alla fine del trattamento per rinite cronica. CIT fino alla scomparsa dei sintomi di rinite acuta.
	Vedere anche	Raffreddore
Rischio, professioni o attività a-	Definizione	Professioni a rischio: conducenti di treni, di camion, di mezzi pesanti, di aerei o di bus; persone che guidano macchine da cantiere o esercitano una professione su scale o impalcature; gruisti; sommozzatori. Attività a rischio: sottomarina, scalata, paracadutismo e parapendio, volo motorizzato, corsa automobilistica e motociclistica.
	Misure	Prima di esercitare attività che possano mettere in pericolo il donatore stesso o altre persone, occorre rispettare, dopo la donazione, un tempo di attesa di almeno 12 ore. Il donatore è responsabile del rispetto delle direttive specifiche alla professione o all'attività. Evitare sforzi fisici importanti il giorno della donazione.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Rosolia	Definizione	Malattia infettiva altamente contagiosa causata dal virus della rosolia.
	Misure	CIT di 1 mese dopo la completa guarigione.
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto
Rotavirus/Enterovirus	Rinvio	Diarrea
Salmonella typhi e paratyphi	Rinvio	Febbre tifoide
Salmonellosi, contatto	Rinvio	Gastroenterite, contatto
Salpingite	Misure	CIT fino a completa guarigione.
Sanguisughe, applicazione di	Misure	CIT di 4 mesi dopo l'applicazione di sanguisughe
Sarcoidosi	Definizione	Malattia sistemica, di causa sconosciuta, con formazione di granulomi, soprattutto nei polmoni, ma anche in altri organi.
	Misure	Accettare se la malattia è acuta e di corta durata, che non necessita alcun trattamento. CID se malattia cronica.
Scarlattina	Misure	CIT fino a completa guarigione e/o 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico.
Scarlattina, contatto	Misure	CIT di 3 giorni dopo il contatto.
Schistosomiasi	Rinvio	Bilarziosi

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Schizofrenia	Definizione	Un gruppo di gravi malattie mentali associate alla perdita della realtà. Questi includono il disturbo schizo-affettivo, il disturbo schizoforme.
	Nota bene	<p>Occorre almeno una valutazione della malattia di base da parte del medico del STR.</p> <p>Occorre tenere conto della polimedicazione e dell'ospedalizzazione.</p>
	Misure	<p>Accettare se stabile il giorno della donazione.</p> <p>Se non è possibile valutare la perdita di realtà della schizofrenia, l'idoneità alla donazione deve essere valutata dal medico del STR.</p>
Sclerosi a placche	Misure	CID.
Sclerosi laterale amiotrofica	Misure	CID.
Seno, biopsia del nodulo	Misure	<p>CIT se vi è dubbio nella diagnosi, fino al ricevimento di ulteriori informazioni.</p> <p>CIT di 1 mese se ablazione di un nodulo benigno al seno e fino a guarigione completa.</p> <p>In caso di malattia maligna prendere le stesse misure che per il criterio «cancro».</p>
	Vedere anche	<p>Cancro</p> <p>Operazione / Intervento (in generale)</p>
Sferocitosi ereditaria	Misure	CID
Shigellosi	Misure	CIT di 6 mesi dopo guarigione completa.
	Vedere anche	Gastroenterite, contatto
Shigellosi, contatto	Rinvio	Gastroenterite, contatto
SIDA / AIDS	Rinvio	HIV

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Sifilide	Misure	CID.
Sifilide, partner sessuale	Misure	CIT di 12 mesi se i test di depistaggio restano negativi.
Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)	Rinvio	Cisti ovarica/ovariche
Sindrome di Martin-Bell	Rinvio	Paralisi facciale
sindrome di Sicca	Rinvio	Occhio secco (sindrome di Sicca)
Sinusite	Misure	CIT fino a completa guarigione dopo una crisi acuta. CIT se in trattamento o se utilizza un decongestionante della mucosa nasale se malattia cronica.
Situazioni a rischio	Definizione	Situazioni che possono minare la salute del donatore e del ricevente.
	Nota bene	Riferirsi anche al frontespizio del "Foglio informativo per i donatori di sangue" (da 1 a 12).
Soffio al cuore	Misure	Accettare se asintomatico, dipendente dalla posizione e leggero fino a 2/6. Tutti gli altri tipi di soffi al cuore devono essere chiariti dal medico curante. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione.
Sordità improvvisa neurologica	Misure	Accettare se trauma acustico. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione in tutti gli altri casi.
Spirale	Misure	CIT per 72 ore dopo l'inserimento.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Splenectomia	Nota bene	Verificare la diagnosi della patologia soggiacente.
	Misure	CIT di 6 mesi dopo l'intervento e fino guarigione completa se splenectomia post-traumatica.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Spondilodisi	Misure	CIT da 6 a 12 mesi dopo l'intervento ed in assenza di complicazioni.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Sterilità	Rinvio	Gravidanza, desiderio di
Sterilizzazione tubarica	Misure	CIT di 1 mese dall'intervento.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Stomatomicosi	Rinvio	Mughetto
Strabismo	Rinvio	Chirurgia oftalmologica
Studi clinici	Misure	<p>CIT per i donatori che partecipano a studi clinici, che prendono dei medicinali non ancora registrati o che si sottopongono a delle iniezioni. Questa raccomandazione vale ugualmente per le persone che partecipano a uno studio di fase 1 (studio di tossicità prima dell'introduzione di un nuovo medicamento).</p> <p>Se dubbi, consultare il medico del STR.</p>
Tachicardia	Misure	CIT se polso > 100/min dopo diverse misure.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Talassemia	Definizione	Alterazione della formazione di emoglobina dovuta a cause genetiche.
	Nota bene	La manifestazione clinica e non la genetica è determinante.
	Misure	Accettare se il donatore è portatore di una alfa o beta talassemia minor, è in buona salute e i suoi valori dell'emoglobina si situano nei limiti ammessi. CID in caso di talassemia major e intermedia.
Tatuaggi	Misure	CIT di 4 mesi
Tifo addominale	Rinvio	Febbre tifoide
Tiroidite autoimmune	Misure	CIT fino a completa guarigione e se il donatore non ha più sintomi.
Tiroidite di Hashimoto	Rinvio	Tiroidite autoimmune
Tonsillectomia	Misure	CIT di 1 mese dopo la guarigione completa del donatore e di 2 settimane dopo la fine di una terapia con antibiotici.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Tonsillite	Misure	CIT fino a guarigione completa e fino a 2 settimane dopo l'assunzione dell'antibiotico.
Tosse canina	Rinvio	Pertosse
Tossicodipendenza	Rinvio	Droga, consumo di
Toxoplasmosi	Misure	CIT di 6 mesi dopo la guarigione.
Tracheite	Misure	CIT fino a completa guarigione.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Transgender / Persone trans	Definizione	<p>Il modo di rivolgersi a un donatore non binario o di genere diverso deve corrispondere ai desideri della persona. Per la sicurezza del donatore e del ricevente, è importante conoscere il sesso biologico. I valori limite di Hb, l'intervallo di donazione e il volume di donazione per l'afesi devono essere scelti nel modo più adatto possibile al sesso ormonale. In caso di dubbio, si devono applicare i criteri più prudenziali.</p> <p>Il plasma di persone che sono o erano donne biologiche non deve essere utilizzato per la trasfusione (rischio: TRALI).</p>
	Misure	CIT durante la fase di transizione medica.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)

Trapianto	Misure	<p>Accettare</p> <p>se tessuto, organo o cellule autologhi o prodotti di trapianto da essi derivati (a dipendenza della malattia di base).</p> <p>CID</p> <ul style="list-style-type: none"> • se tessuto, organo o cellule (compresi i tessuti o le cellule embrionali o fetali), allogeneiche o prodotti di trapianto da essi derivati • se xenotrapianto • se trapianto di cellule staminali (autologo e allogeneico).
------------------	--------	--

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Trasfusione di sangue	Definizione	<p>Prodotti labili: CE, CP, PFC omologo</p> <p>Prodotti stabili: albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione estratti dal plasma.</p> <p>Fattori della coagulazione: prodotti del genio genetico.</p>
	Nota bene	<p>Informarsi sull'anamnesi della patologia. La CIT dopo somministrazione di emoprodotti stabili è legata alla gravità della malattia sottostante.</p>
	Misure	<p>Accettare solamente dopo il trattamento con prodotti ricombinanti (non originati da plasma umano), in assenza di controindicazioni date dalla malattia sottostante.</p> <p>CIT di 12 mesi dopo un trattamento con prodotti stabili (immunoglobuline)</p> <p>CID si trasfusione di prodotti labile dopo 1980.</p> <p>Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.</p>
	Vedere anche	<p>Operazione / Intervento (in generale)</p> <p>Rapporti sessuali, partner intimi</p>

Trattamenti laser: Laser per il distacco della retina, laser per la cornea	Rinvio	Chirurgia oftalmologica
---	--------	-------------------------

Trauma cranico (SDH)	Definizione	<p>Lesione dell'osso cranico e/o del cervello. Può essere causata da una forza esterna diretta alla testa o da una brusca accelerazione e decelerazione della testa e del rachide cervicale.</p> <p>Comprende anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commozione cerebrale (Commotio cerebri) • contusione cerebrale (Contusio cerebri) • compressione cerebrale (Compressio cerebri)
	Misure	<p>Accettare se guarigione completa e in assenza di limitazioni funzionali.</p>
	Vedere anche	<p>Chirurgia neurologica</p> <p>Epilessia</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Tripanosoma cruzi	Rinvio	Chagas, malattia di-
Tripanosomiasi africana	Misure	CID.
Trombocitemia primitiva	Misure	CID.
Trombocitopenia	Misure	CID.
Trombofilia	Vedere anche	Coagulazione, disturbi della Trombosi, arteriosa Trombosi, venosa profonda Trombosi, venosa superficiale
Trombosi coronarica	Misure	CID.
Trombosi del seno venoso cerebrale	Misure	CID.
Trombosi dell'arteria oftalmica	Definizione	Occlusione delle arterie, con conseguente riduzione del flusso sanguigno alla retina; si tratta di un "ictus nell'occhio" o infarto.
	Misure	CID
Trombosi oftalmica	Definizione	Occlusione delle vene, con conseguente riduzione del flusso sanguigno alla retina.
	Misure	CID.
Trombosi, arteriosa	Misure	CID.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Trombosi, venosa profonda	Nota bene	L'incidenza di recidiva dopo una tromboembolia venosa è indipendente dalla durata dell'anticoagulazione (fenomeno catch-up) e ammonta a circa il 5–10 per cento.
	Misure	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento anticoagulante. CID se recidiva.
	Vedere anche	Trombosi del seno venoso cerebrale Trombosi oftalmica
Trombosi, venosa superficiale	Nota bene	Anticoagulazione.
	Misure	CIT di 1 mese dopo la guarigione completa. CID se recidiva.
Trucco semipermanente	Rinvio	Tatuaggi
Tubercolosi	Misure	CIT di 2 anni dopo la fine delle cure mediche e del trattamento. CID se recidiva sotto trattamento.
	Vedere anche	Mantoux, test di-
Tubercolosi, contatto	Rinvio	Mantoux, test di-
Tunnel carpale, operazione	Misure	CIT di 1 mese dopo l'intervento.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Turner, sindrome di-	Definizione	Malattia causata da aberrazione dei cromosomi x e y. C: tratti somatici caratteristici, sterilità, problematiche cardiovascolari.
	Misure	CIT se peso inferiore alla norma e/o cardiopatia congenita.
Ulcera venerea	Rinvio	Gonorrea

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Uretrite non specifica	Misure	CIT fino a guarigione completa dopo una crisi acuta e di 2 settimane dopo la fine dell'antibiototerapia. CID se malattia cronica.
-------------------------------	--------	--

Urinarie, infezione delle vie-	Misure	CIT fino a completa guarigione e 2 settimane dopo la fine dell'antibiototerapia. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione in caso di infezioni recidivanti.
---------------------------------------	--------	--

Uveitis	Definizione	L'uveite è un'inflammatione oculare che coinvolge la membrana vascolare (uvea) dell'occhio.
	Nota bene	Chiedere informazioni sulla malattia di base.
	Misure	Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione

Vaiolo delle scimmie	Misure	CIT di 21 giorni dopo guarigione completa CIT di 21 giorni dopo un contatto stretto con una persona infetta (partner intimo, persona dello stesso nucleo familiare).
-----------------------------	--------	---

Valvulopatia	Misure	Rinvio a: Malattie cardiovascolari
---------------------	--------	------------------------------------

Vaquez-Osler, malattia di-	Rinvio	Policitemia vera
-----------------------------------	--------	------------------

Varicella	Definizione	Malattia virale dovuta a infezione iniziale con il virus varicella-zoster (famiglia degli Herpesvirus).
	Misure	CIT di 1 mese dopo la completa guarigione.
	Vedere anche	Malattie infettive, contatto

Varici, trattamento chirurgico	Misure	CIT di 1 mese dopo il trattamento chirurgico.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

Varicocele, operazioni	Misure	CIT di 1 mese dopo l'operazione.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Vasectomia	Misure	CIT di 1 mese dopo l'operazione.
	Vedere anche	Operazione / Intervento (in generale)
Vermi	Rinvio	Nematodi
Verruca	Misure	Accettare se il trattamento è esclusivamente locale e in assenza di lesione dei tegumenti.
Vertigini	Misure	CIT se sintomatico e sotto terapia. Da chiarire, se causa sconosciuta.
Vitiligine	Misure	CID in presenza di sintomi di un problema sistemico.
Vitrectomia	Definizione	Per vitrectomia si intende la rimozione chirurgica di parti del corpo vitreo o addirittura dell'intero corpo vitreo dall'occhio.
	Misure	Rinvio a chirurgia oftalmologica.
Von Willebrand, sindrome di-	Definizione	Disturbo della coagulazione ereditario o acquisito, in cui il fattore vW è diminuito, funziona male o manca del tutto.
	Misure	CID se sintomatica. Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione se la diagnosi è stata posta sulla base di un bilancio familiare.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Allegato Art. 7.5 Criteri d'attitudine	
	Tipo di documento: ANH	
	Entrata in vigore: 01.02.2025	Versione: 2

West Nil-virus, malattia	Definizione	Malattia trasmessa da zanzare. C: febbre. Prognosi buona.
	Misure	CIT di 1 mese dopo il rientro da un soggiorno in una zona a rischio. CIT di 4 mesi dopo guarigione completa. Rinvio Capitolo 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.
Yersiniosi	Rinvio	Shigellosi
Zecca, puntura di	Misure	CIT di 4 settimane dopo una puntura di zecca, in assenza di sintomi.
	Vedere anche	Lyme, malattia di Rickettsiosi
Zikavirus	Misure	CIT di 1 mese dopo il rientro da un soggiorno in una zona a rischio. CIT di 3 mesi dopo rapporto sessuale con partner con comprovata infezione da Zika CIT di 4 mesi dopo guarigione completa. Rinvio Cap. 17E / Allegato Art. 7.2: Travelcheck – Paesi a rischio di malattie infettive.