

A	Symptômes locaux - liés à la ponction		
A1	Lésion de vaisseaux (épanchement de sang, accumulation de sang dans les tissus)		
A1.1	Hématome veineux (apparition dans les locaux du site de prélèvement)	Degré 1	<ul style="list-style-type: none"> • local au point de ponction: <ul style="list-style-type: none"> • enflure, • douleur, • coloration de la peau (épanchement de sang) • étendue < 50 mm
		Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Etendue > 50 mm • Limitation fonctionnelle ou douloureuse
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation par des spécialistes
A1.2	Ponction artérielle	Degré 1	<ul style="list-style-type: none"> • Douleur au point de ponction • Sang de couleur plus claire que normal • Remplissage rapide de la poche de sang • Mouvements de l'aiguille dus aux pulsations artérielles • Etendue de l'hématome < 50 mm
		Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs plus fortes et de longue durée • Etendue de l'hématome > 50 mais < 100 mm • Limitation fonctionnelle ou douloureuse
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation par des spécialistes
A1.3	Hématome tardif (apparition en dehors du site de prélèvement)	<ul style="list-style-type: none"> • Après une ponction veineuse ou artérielle • <i>Classement du degré de gravité comme ci-dessus</i> 	
A2	Lésion d'autres structures anatomiques (douleur)		

A2.1	Irritation nerveuse/lésion nerveuse	Degré 1	<ul style="list-style-type: none"> • Forte douleur au moment de la ponction ou lors du retrait de l'aiguille • Irradiation de la douleur • Paresthésies • Troubles pendant < 2 semaines
		Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Troubles pendant > 2 semaines mais < 1 an • Parésie sensitive locale
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Troubles pendant > 1 an • Parésies motrices • Evaluation par des spécialistes
A2.2	Douleurs non spécifiques dans les bras	Degré 1	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs locales ou irradiantes • Immédiates ou tardives • Aucune classification dans les catégories décrites précédemment
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Lésion d'un tendon par l'aiguille • Douleur locale forte non irradiante
A3	Infections locales/inflammations		
A3.1	(Thrombo-) phlébite	Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Hyperthermie, douleur, rougeur et enflure
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Formation d'un thrombus, évent. accompagné de fièvre
A3.2	Cellulite, Inflammation cutanée locale	Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Infection survenant hors de la circulation veineuse • Enflure, rougeur et douleur
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Erysipèle
A4	Autres affections graves des vaisseaux		



A4.1	Thrombose veineuse profonde (TVP)	Degré 3	
A4.2	Fistule artérioveineuse		
A4.3	Syndrome des loges		
A4.4	Pseudo-anévrisme de l'artère brachiale		
B	Symptômes généralisés / réactions circulatoires vasovagales		
	Dans les locaux du site de prélèvement		
B1-B5*	RVV SANS lésion	Degré 1	<ul style="list-style-type: none">• Malaise, faiblesse, peur, vertiges• Pâleur, sueurs, nausées (pré-collapsus)• Brève perte de conscience (syncope, collapsus) < 60 sec• Chute de la pression artérielle et du pouls• Rétablissement spontané
		Degré 2	<ul style="list-style-type: none">• Vomissements, incontinence, spasticité• Syncope récidivante• Rétablissement retardé• Perte de conscience (syncope, collapsus) > 60 sec• Intervention nécessaire, p. ex. remplacement volumique
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none">• Rétablissement fortement retardé• Transfert au service des urgences• Réanimation
	RVV AVEC lésion	Degré 2	<ul style="list-style-type: none">• Syncope avec chute ou accident et lésion locale
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none">• Syncope avec chute ou accident et traumatisme sévère



* Définitions :

- B1 SANS perte de conscience
- B2 AVEC perte de conscience < 60 secondes SANS lésion
- B3 AVEC perte de conscience < 60 secondes AVEC lésion
- B4 AVEC perte de conscience > 60 secondes SANS lésion
- B5 AVEC perte de conscience > 60 secondes AVEC lésion

Hors du site de prélèvement		
B6	RVV sans lésion	- Classement du degré de gravité comme ci-dessus
B7	RVV avec lésion	- Classement du degré de gravité comme ci-dessus

C	Effets indésirables spécifiques de l'aphérese		
C1	Réaction au citrate	Degré 1	<ul style="list-style-type: none">• Paresthésies péri orales (fourmillements), pointes des doigts, bouffées de chaleur• Goût métallique dans la bouche
		Degré 2	<ul style="list-style-type: none">• Paresthésies plus largement étendues• Accompagnées de nausées et de vomissements• Interruption du don, ev. Ca iv
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none">• Tétanie sévère ou crampes• Troubles du rythme cardiaque
C2	Hémolyse	Degré 3	
C3	Embolie gazeuse	Degré 3	

C4	Infiltration	Degré 2	
D	Réaction allergique		
D1	Réaction allergique locale	Degré 1	<ul style="list-style-type: none"> • Exanthème, enflure, démangeaisons au point de ponction
D2	Réaction allergique généralisée	Degré 2	<ul style="list-style-type: none"> • Flush généralisé ou urticaire sans organe infecté • Symptômes différents, p. ex. chute de la pression artérielle, troubles respiratoires, vomissements, etc.
		Degré 3	<ul style="list-style-type: none"> • Choc anaphylactique
E	Autres réactions sévères		
E1	Symptômes cardiaques aigus, p. ex. angine de poitrine	Degré 3	
E2	Infarctus du myocarde		
E3	Arrêt cardiaque		
E4	AIT		
E5	Accident vasculaire cérébral		
E6	Décès	Degré 4	
F	Les autres effets indésirables, les problèmes rarement annoncés doivent être spécifiés		