

Chapitre 17D / Annexe Art. 7.3

Vaccine Check - Check vaccination

Valable dès: 17/12/2024
version 7

Les délais applicables au don de cellules souches (CT/VT et MC) sont les mêmes que pour le don de sang (prélèvement: contacter SBSC).

Légende ajouté modifié supprimé

Anatoxines et vaccins inactivés ou à sous-unité protéique ou à base de vecteurs non réplicatifs ou à base d'ARNm

COVID-19	Comirnaty® de Pfizer/BioNTech	48 heures
COVID-19	COVID-19 Vaccine Moderna®, Spikevax®	48 heures
COVID-19	COVID-19 Vaccine Janssen, Johnson & Johnson	48 heures
COVID-19	Nuvaxovid von Novavax	48 heures
Cancer du col de l'utérus / Verrues génitales (papillomavirus humain / HPV)	Gardasil®, Cervarix®	48 heures
Charbon (Anthrax)		48 heures
Choléra	Dukoral®	48 heures
Coqueluche (Pertussis) (seul ou combiné)		48 heures
Diphthérie (seul ou combiné)		48 heures
Encéphalite japonaise	Ixiaro®	48 heures
Grippe (saisonnière)		48 heures
Herpès génital	Lupidon®	48 heures
Hépatite A (seul ou combiné)	seul ou combiné	2 semaines
Hépatite B (seul ou combiné)	seul ou combiné	2 semaines
Méningite (à Haemophilus influenzae de type b)		48 heures
Méningite à méningocoques		48 heures
Méningoencéphalite à tiques	FSME-Immun®, Encepur N®	48 heures
Pneumonie à pneumocoques		48 heures
Poliomyélite (paralysie infantile, vaccin parentéral de Salk) (seul ou combiné)		48 heures
Rage	Rabipur®	48 heures
Tétanos (seul ou combiné)		48 heures
VRS (Virus respiratoire syncytial humain)	Arexvy®, Abrysvo®	48 heures
Varicelle-zona	Shingrix®	48 heures

Vaccins vivants atténués ou à base de vecteurs réplicatifs

Dengue	Qdenga®	4 semaines
Fièvre jaune	Stamaril®	4 semaines
Fièvre typhoïde / paratyphoïde (oral)	Vivotif®	4 semaines
Rotavirus	Rotarix®	4 semaines
Rougeole-oreillons-rubéole		4 semaines
Rougeole-oreillons-rubéole-varicelle	Proquad®	4 semaines
Rubéole (seul ou combiné)		4 semaines
Tuberculose (BCG)		4 semaines
Varicelle		4 semaines
Variole simienne (Mpox), Variole	Jynneos®	4 semaines
Zona (herpes zoster)	Zostavax®	4 semaines

Immunisation passive après exposition (administration d'immunoglobulines)

Rage	Berirab®	12 mois
Tétanos	Tetagam®	12 mois

Vaccin contenant de l'albumine humaine

Rage	Vaccin rabique Mérieux®	12 mois
------	-------------------------	---------

Vaccins supprimés

Choléra		
---------	--	--

Vaccins non autorisés

Période d'attente de 12 mois		
------------------------------	--	--